

VII Congreso Iberoamericano de Neuropsicología y V congreso Colombiano de Neuropsicología. Cartagena, Colombia. Septiembre 23 al 25 de 2026

POSTERS

Adaptación transcultural y análisis de validez de contenido de una prueba de memoria semántica infantil para población colombiana

Adriana M. Martínez Martínez, Diego Armando León-Rodríguez, Loretta van Iterson

Pontificia Universidad Javeriana

La evaluación neuropsicológica infantil requiere instrumentos culturalmente pertinentes que representen adecuadamente los constructos cognitivos en los contextos donde serán aplicados. La adaptación transcultural constituye un proceso metodológico esencial para garantizar equivalencia conceptual, semántica y funcional antes de iniciar estudios de validación psicométrica. Objetivo: Describir el proceso de adaptación transcultural y analizar la validez de contenido de la prueba iter-SEIN, diseñada para evaluar memoria semántica infantil mediante dos historias paralelas que, a través de recobro libre y preguntas de evocación guiada, permiten medir recuerdo inmediato, retención a corto plazo, recuerdo a 24 horas y memoria diferida a siete días, en población colombiana y mexicana. Método: Se realizó un estudio instrumental de adaptación cultural con participación de expertos en neuropsicología infantil y lenguaje de Colombia y México. El proceso incluyó: (1) traducción

directa del neerlandés al español y revisión conceptual del constructo; (2) evaluación sistemática por jueces expertos de unidades narrativas, instrucciones y preguntas según criterios de pertinencia del contenido, claridad semántica, equivalencia cultural y adecuación evolutiva, seguida de ajustes iterativos por consenso; (3) pilotaje en población infantil colombiana ($n=12$) y mexicana ($n=10$) para examinar comprensión narrativa y adecuación léxica; y (4) consenso ampliado de expertos ($n=8$) para consolidar la versión adaptada. Resultados: El proceso permitió ajustes lingüísticos y estructurales, optimización del nivel léxico y reorganización de preguntas, confirmando coherencia entre la estructura narrativa y el proceso mnésico evaluado. La equivalencia entre versiones paralelas continúa en evaluación. Conclusiones: La adaptación aporta evidencia sistemática de validez de contenido y establece bases para futuros estudios psicométricos y normativos en Latinoamérica.

Efecto de la presencia de alucinaciones sobre el perfil neuropsicológico de personas con enfermedad de Parkinson

Solano-Montes de Oca S., Correa-Medina E. I, Solís-Vivanco R.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez,
Ciudad de México, México.

La presencia de alucinaciones y deterioro cognitivo en personas con enfermedad de Parkinson (EP) son parte de su sintomatología no motora frecuente y suelen agravarse conforme la enfermedad progresa. No obstante, se desconoce si la presencia de alucinaciones corresponde con fallas ejecutivas y de memoria específicas, o si es un predictor de deterioro cognitivo global, en este padecimiento. Objetivo: Comparar la frecuencia de falsos positivos y errores de intrusión presentados en pruebas neuropsicológicas entre personas con EP con y sin alucinaciones, y su asociación con la presencia de deterioro cognitivo. Método: Se evaluaron 71 personas con EP mediante una batería neuropsicológica completa y entrevista estructurada. Los pacientes se clasificaron como EP sin alucinaciones (EP-SA; $n = 43$) y con alucinaciones (EP-CA; $n = 28$), y se compararon utilizando pruebas t de Student y U de Mann-Whitney. Resultados: El grupo con alucinaciones

mostró significativamente más falsos positivos en la tarea de memoria verbal ($r = -0.42$, $p = .037$), así como también más intrusiones en la curva de memoria espontánea ($t = -1.17$, $p = .002$). No se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos en las demás en la puntuación de cognición global medida con él. Sin embargo, si se observaron, correlaciones significativas entre el puntaje total de MoCA y el número de falsos positivos ($r = -0.509$, $p < .001$) y de intrusiones ($r = -0.371$, $p = .017$). Conclusiones: La presencia de alucinaciones se asoció con alteraciones en tareas que implican discriminación y monitoreo (falsos positivos e intrusiones), así como con el deterioro cognitivo global. Nuestros resultados respaldan la idea de que las alucinaciones podrían estar relacionadas con déficits en mecanismos de monitoreo perceptual y su presencia podría indicar mayor severidad del deterioro cognitivo en personas con EP.

Más allá de la sintomatología: hallazgos neuropsicológicos en un caso clínico de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

Ángel Escobedo Rivera

Ángel Escobedo Rivera, Perla Teresa Arellano Virto

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM

Objetivo: describir los hallazgos neuropsicológicos de una paciente con TOC. **Método:** anamnesis clínica y batería neuropsicológica: NEUROPSI, D2, Torre de Londres, Test de Clasificación de tarjetas de Wisconsin WCST, Test de Colores y Palabras STROOP e Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota MMPI-2. **Resultados:** Los hallazgos muestran habilidades cognitivas de memoria, atención y memoria de trabajo conservadas. Se encuentran principalmente alteraciones en las funciones ejecutivas de planeación y organización, inhibición, flexibilidad

cognitiva y monitoreo de su propia conducta. Se reportan problemas emocionales de ansiedad, problemas del pensamiento relacionados con experiencias perceptuales inusuales, alteraciones en el funcionamiento interpersonal relacionadas con el aislamiento y la evitación social y quejas somáticas asociadas al malestar psicológico. **Conclusiones:** A partir de la entrevista y de la evaluación administrada, se puede determinar que la paciente presenta una notoria alteración en las funciones ejecutivas y que se observaron comprometidas a partir del TOC.

Reconocimiento de emociones morales en adolescentes infractores

Antonio Arrázola Vernaza (1), Daniela Moreno Arrieta (1), Emilia Machado Boada (1),
Claudia Idárraga (3), Mariana Pino (2), Sandra Báez (1).

Universidad de Los Andes (1); Universidad Autónoma del Caribe (2); Universidad
Metropolitana de Barranquilla (3).

Objetivo: Examinar diferencias en el reconocimiento de emociones morales y sus correlatos estructurales entre adolescentes infractores y controles. **Método:** Participaron 73 adolescentes infractores y 56 controles de Barranquilla. Completaron una tarea de reconocimiento emocional basada en escenarios hipotéticos que evocaban emociones morales (p. ej., culpa, vergüenza) y no morales. Se evaluaron funciones ejecutivas e inteligencia mediante el INECO Frontal Screening (IFS), Stroop y los subtests de Matrices, Vocabulario y Semejanzas del WAIS-IV. Se adquirieron imágenes estructurales T1 por resonancia magnética y se realizaron análisis de Morfometría Basada en Vóxeles (VBM), junto con pruebas t, ANCOVAs y regresiones múltiples. **Resultados:** Los adolescentes infractores mostraron menor desempeño en el reconocimiento de emociones morales y no morales en comparación con los controles; estas diferencias

persistieron tras controlar educación y variables cognitivas. En los infractores, el reconocimiento de emociones morales se asoció con mayor volumen en la corteza cingulada posterior derecha, y el de emociones no morales con mayor volumen en el giro lingual derecho. En los controles, las emociones morales se asociaron con menor volumen en el giro occipital medio izquierdo, y las no morales con menor volumen en el giro temporal inferior derecho. **Conclusiones:** Los adolescentes infractores presentan dificultades en el reconocimiento de emociones morales y no morales, acompañadas de asociaciones estructurales cerebrales distintas a las observadas en controles. Estos hallazgos sugieren que el procesamiento emocional en esta población podría involucrar patrones estructurales diferenciados, potencialmente relacionados con variaciones en circuitos implicados en integración socioemocional y evaluación moral.

Asociación del perfil lipídico con niveles de depresión y ansiedad en una población del Occidente de México

Isis Mariela Herrera-Tirado, Luis Eduardo Becerra-Solano, Monserrat Macías-Carballo

Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara, Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, C.P. 47620, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.

Introducción: En Jalisco, México se reportan altas tasas de depresión (4.4 %) y ansiedad (16 %). Estudios sugieren que los lípidos desempeñan un papel fundamental en distintos procesos neuronales; por lo tanto, su déficit podría influir en procesos relacionados con la salud mental. **Objetivo:** Determinar la asociación entre el perfil lipídico y los niveles de depresión y ansiedad en adultos jóvenes de la región de los Altos Sur de Jalisco. **Metodología:** Estudio de casos y controles donde se incluyeron 254 sujetos. Se aplicaron el Inventario de Depresión de Beck II y el inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE). El estudio se realizó conforme a la normatividad de bioética y

bioseguridad. **Resultados:** En el análisis de asociación entre depresión y niveles bajos de lípidos no se observaron asociaciones estadísticamente significativas: colesterol (OR = 1.19, IC = 0.69–2.05, $p = 0.51$), triglicéridos (OR = 0.54, IC = 0.25–1.15, $p = 0.15$) y ApoB (OR = 0.62, IC = 0.37–1.02, $p = 0.08$). De igual forma, en el grupo con ansiedad no se encontró asociación con colesterol (OR = 0.82, IC = 0.48–1.41, $p = 0.58$), triglicéridos (OR = 0.74, IC = 0.36–1.56, $p = 0.53$) y ApoB (OR = 0.74, IC = 0.67–1.10, $p = 0.28$). **Conclusión:** No se identificó una asociación estadísticamente significativa entre el perfil lipídico y los niveles de depresión y ansiedad en la población estudiada.

Evaluación neuropsicológica remota en veteranos hispanohablantes: retos culturales desde la evidencia científica

Beatriz P Ortiz-Lebrón PhD, Gisela González-Elías PhD

Universidad Albizu

El objetivo principal del estudio fue analizar los principales retos culturales en la evaluación neuropsicológica remota en

veteranos hispanohablantes a partir de la evidencia científica reciente (2021–2026), identificando factores que impactan el desempeño cognitivo y la interpretación de resultados. Se realizó una revisión narrativa de literatura publicada entre 2021 y 2026 sobre telemedicina, evaluación cognitiva remota en adultos y equidad en telesalud, enfocada en barreras tecnológicas, alfabetización digital, factores socioeconómicos y consideraciones culturales en poblaciones diversas. Los resultados indican que la evidencia identifica cinco retos culturales principales, incluyendo el idioma y lenguaje, con limitaciones en la equivalencia de instrumentos; el nivel educativo, con impacto significativo en el desempeño cognitivo; la alfabetización digital, asociada a ansiedad tecnológica y acceso desigual; el estilo cultural de respuesta, que influye en la

expresión de síntomas; y el contexto sociocultural, que incluye factores socioeconómicos y experiencias de vida. Estos elementos afectan la validez de la evaluación y aumentan el riesgo de sobrediagnóstico o subestimación cuando no se consideran adecuadamente. Se concluye que la evaluación neuropsicológica remota en veteranos hispanohablantes requiere una aproximación culturalmente informada que integre factores lingüísticos, educativos y contextuales. Asimismo, la evidencia resalta la necesidad de desarrollar competencias culturales, utilizar instrumentos apropiados y adoptar marcos integradores que permitan garantizar interpretaciones válidas y éticamente responsables.

Análisis neuropsicológico del desempeño cognitivo en neuromielitis óptica comparado con esclerosis múltiple.

Berger Mendoza Kevin Brandon, Mayaro Ortega Luyando

Facultad de Estudios Superiores Iztacala. UNAM.

El trastorno del espectro de neuromielitis óptica (NMOSD) es una enfermedad desmielinizante autoinmune del sistema nervioso central caracterizada por la presencia de anticuerpos AQP4-IgG. A nivel cognitivo, se han reportado afectaciones principalmente en funciones ejecutivas, atención sostenida, memoria de trabajo y fluidez verbal, con relativa preservación de habilidades visuoespaciales. Estas alteraciones impactan significativamente la funcionalidad diaria. La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica autoinmune caracterizada por la desmielinización y disfunción en la transmisión neuronal. El objetivo del estudio es comparar el perfil neuropsicológico de pacientes con NMOSD y EM. Se propone una evaluación mediante una batería

neuropsicológica integral evaluando principalmente: atención, memoria, lenguaje y funcionamiento ejecutivo. Actualmente, el estudio se encuentra en fase preliminar, con una muestra no probabilística de tipo intencional, se han evaluado 13 pacientes con EM y 16 con NMOSD. Dando como resultados, perfiles heterogéneos en algunas funciones cognitivas y compartiendo el mismo perfil cognitivo en otras. Los datos se analizaron inicialmente mediante estadística descriptiva (moda, media y porcentajes), utilizando el paquete SPSS, con un análisis de datos no paramétricos (U de Mann Whitney). Los hallazgos contribuirán al establecimiento de perfiles clínicos que orienten la evaluación y el abordaje neuropsicológico en esta población.

Perfil neuropsicológico en niños con tumor de fosa posterior: un estudio descriptivo

Alma Griselda Ramírez-Reyes, Romina Hernández-González, Mariana Merino-Sierra,
Paula Saray López-Ramos, Melanie Mariel Garza-Miranda

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

Los tumores del sistema nervioso central constituyen la segunda neoplasia más frecuente en la población pediátrica; de estos, los localizados en fosa posterior representan aproximadamente el 48%, con potencial impacto en el funcionamiento cognitivo. El objetivo del presente estudio fue describir el perfil neuropsicológico en niños con tumores de fosa posterior. Participaron 12 niños mexicanos con una edad media de 12 años, de los cuales 4 presentaban tumores en región lateral y 8 en región medial. Todos fueron evaluados en fase prequirúrgica en un entorno intrahospitalario. La valoración incluyó medidas de capacidad intelectual, atención, memoria, lenguaje, habilidades visuoespaciales y funciones ejecutivas. El análisis del perfil se realizó con base en la Clasificación Internacional para los Trastornos Cognitivos en Epilepsia, la cual

considera cinco dominios: lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, habilidades visuoespaciales y atención/velocidad de procesamiento. Los resultados evidenciaron un perfil de afectación multidominio, caracterizado por capacidad intelectual límite y alteraciones en atención, memoria y funciones ejecutivas; particularmente, memoria de trabajo, fluidez fonológica y abstracción. No se observaron diferencias significativas en función de la localización tumoral. Estos hallazgos sugieren la implicación de redes cerebelo-prefrontales, asociadas a síndromes disejecutivos. Se destaca la necesidad de estudios longitudinales con grupos control que permitan una mejor caracterización del perfil neuropsicológico, así como el diseño de estrategias de intervención oportunas en fases pre y postquirúrgicas.

Diseño de un juego serio para estimular la flexibilidad cognitiva en niños de 8–12 años

Catalina Quiñones Zurek, Valeria Bojanini, Paola Suárez-Pico

Pontificia Universidad Javeriana

La flexibilidad cognitiva (FC) es una función ejecutiva que permite cambiar de perspectiva, alternar entre reglas o estrategias, y adaptar la conducta ante demandas cambiantes del entorno. Esta habilidad es fundamental para el aprendizaje, la resolución de problemas y la adaptación durante la infancia. Sin embargo, persiste una brecha entre el conocimiento teórico sobre funciones ejecutivas y la disponibilidad de herramientas prácticas para su estimulación en contextos educativos y cotidianos. En este sentido, los juegos serios representan una estrategia prometedora al integrar objetivos formativos con dinámicas lúdicas que favorecen la motivación y la práctica de habilidades cognitivas. El objetivo de este estudio fue diseñar un juego serio orientado a estimular la FC en niños de 8 a 12 años. Se empleó un diseño instrumental desarrollado en tres fases: (1) fundamentación teórica y selección del modelo conceptual de referencia; (2) diseño de las actividades y contenidos del juego

mediante consenso de expertos en psicología y neuropsicología; y (3) desarrollo del prototipo. Como resultado se desarrolló FLEXCIVILIZATION, un juego serio en el que los jugadores viajan por Egipto, Grecia y Roma con la misión de restablecer el orden del tiempo. A través de desafíos progresivos, los participantes deben cambiar estrategias, adaptarse a nuevas reglas y responder a cambios inesperados para obtener pistas y avanzar en la historia. Cada reto se acompaña de estrategias orientadas a promover procesos de metacognición, regulación emocional y resolución de problemas, con el fin de fortalecer la capacidad de adaptación ante situaciones cambiantes. Este trabajo presenta una herramienta lúdica y teóricamente fundamentada que busca acercar los avances de la neuropsicología de las funciones ejecutivas al desarrollo de recursos aplicados para la infancia. Futuras investigaciones se orientarán a la validación de contenido y al pilotaje del juego.

Enfermedad de Alzheimer, Conectoma y Evaluación Psicológica: Acercamiento a las redes neuronales por dominios cognitivos

Claudia Ovalle

Universidad de Antioquia

Se propone usar indicadores cognitivos medidos con test psicológicos tradicionales, pero considerando que se asocian con daño en las redes neuronales del conectoma (Seung, 2010; 2012; Chen et al., 2016). Es decir, hacer medición indirecta de los daños, que hoy en día se hace con el escaneo neurológico, pero sin implicar los mismos costos. Según Yeo, et al (2011) y Hagman et al. (2008), las redes del conectoma incluyen: Red por defecto (Default Mode Network) encargada de autoconciencia, recuerdos e imaginación; la red de atención

dorsal (atención voluntaria) y ventral (atención a estímulos inesperados); la red ejecutiva (toma de decisiones, memoria de trabajo y control cognitivo); la red de saliencia (decide a qué prestar atención); redes sensoriomotoras (control del movimiento y la acción) y redes visuales (incluyen las rutas “que” y “donde” de identificación de objetos). Desde la Psicología y la psicometría avanzada se pueden abordar medidas de estas redes de forma indirecta en particular en los periodos del desarrollo de la AD.

Síntomas prefrontales y procrastinación en adultos

Edgar Díaz-Camargo; Josue Caballero-Galvis; Estefania Sotamba-Cordero; Lina Villamizar-Mosquera

Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro de Investigación en Estudios Fronterizos, Cúcuta, Colombia.

La procrastinación, definida como la postergación habitual de responsabilidades pese a sus consecuencias negativas, ha dejado de ser vista como un simple rasgo de carácter para entenderse como un fenómeno complejo de desregulación cognitiva y emocional. Este comportamiento se vincula estrechamente con el funcionamiento del lóbulo prefrontal, área crítica para las funciones ejecutivas, la planificación y la toma de decisiones. El objetivo fue analizar la relación entre los síntomas prefrontales y la procrastinación en una muestra de adultos residentes en el departamento de Norte de Santander. Se empleó un diseño no experimental, de corte transversal y alcance descriptivo-correlacional bajo un paradigma positivista. La muestra estuvo constituida por 715 adultos de entre

18 y 40 años. Se aplicaron el Inventario de Síntomas Prefrontales (ISP) y la Escala General de Procrastinación (GPS) para recolectar los datos. Los hallazgos revelaron una correlación positiva moderada ($r \approx 0.33$) entre la sintomatología prefrontal total y la tendencia a procrastinar. Las dimensiones con mayor presencia de síntomas fueron los problemas motivacionales ($M = 8.38$) y el control ejecutivo ($M = 13.66$). Se concluye que la procrastinación en esta población, mayoritariamente joven y de estratos socioeconómicos bajos, está estrechamente ligada a déficits en la autorregulación y la gestión de metas, lo que subraya la necesidad de intervenciones neuropsicológicas orientadas al fortalecimiento de las funciones ejecutivas para mejorar la calidad de vida en la región.

Aportes de la neuropsicología para evaluación y abordaje de una enfermedad rara: síndrome de Turner

Enith Liliana Reyes, Katherine Salazar, Carolina Cárdenas Vargas.

Grupo de Investigación GIDEAL

Objetivo: Describir el perfil neuropsicológico y resultados de intervención con una joven con Síndrome de Turner, para aportar al conocimiento de esta enfermedad rara, al diagnóstico oportuno y abordaje integral. Métodos: Enfoque cualitativo. Estudio de caso único. Resultados: El Síndrome de Turner, es una enfermedad rara y descrita como sindrómica. La causa se asocia a monosomía parcial o total del cromosoma X. La prevalencia se estima en torno a 1/2500-3000 recién nacidas vivas. Es típico la disgenesia gonadal, talla baja, linfedema distal, rasgos fenotípicos dismórficos que pueden apreciarse desde el nacimiento. También es común, la cardiopatía congénita, anomalías renales, hipoacusia temprana, síndrome metabólico, hipertensión, diabetes, infertilidad y problemas neuropsiquiátricos. La inteligencia suele ser normal, con tendencia a presentar dificultades de aprendizaje, especialmente en las

áreas no verbales, como la visoespacial y razonamiento numérico, las pacientes pueden presentar trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Los resultados de la evaluación del caso, evidenciaron coeficiente intelectual límite, déficit intelectual leve a moderado, trastorno de déficit de atención tipo inatento y de un trastorno mixto de las habilidades escolares. La evaluación neuropsicológica pos intervención, evidenció cambios favorables en el razonamiento no verbal, en la atención y memoria visual. Conclusiones: El conocimiento de esta enfermedad rara y el diagnóstico temprano es necesario para iniciar tratamiento oportuno. Contribuye a la evolución favorable, a la calidad de vida de las pacientes con esta enfermedad y al pronóstico funcional. Las pacientes requieren atención transdisciplinaria y rehabilitación neuropsicológica para preservar el funcionamiento cognitivo global.

La correlación de la percepción visual del movimiento biológico con la sociabilidad se pierde en etapas tempranas de un modelo murino de TEA

Esteban E. Aliaga, Carla A. Villagra, Nelva T. Quezada, Francisco A. Vivero, Aylin Albornoz, Katherine P. Morgado-Gallardo and Jenny L. Fiedler

Centro de Investigación en Neuropsicología y Neurociencias Cognitivas (CINPSI-Neurocog), Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.
Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.
Laboratorio de Neuroplasticidad y Neurogenética, Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Universidad de Chile, Santiago, Chile.
Escuela de Tecnología Médica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Católica del Maule, Talca, Chile.

Existe acuerdo en que la alteración neuropsicológica principal en el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es el déficit en Teoría de la Mente (ToM), es decir la habilidad de descifrar «lo que ocurre» en la mente del otro, incluyendo creencias, motivaciones e intenciones que están detrás de su conducta, donde la Percepción del Movimiento Biológico (PMB), que extrae patrones cinemáticos de las acciones observadas, es un componente fundamental. Para comprender el papel de la percepción y ejecución del movimiento en el desarrollo de la ToM hemos realizado estudios conductuales en un modelo murino de TEA (exposición embrionaria a Valproato). Nuestro análisis cinemático del movimiento en ratas juveniles control durante el test social de tres cámaras (TS3C) mostró que los parámetros de “aceleración” y “detenciones” cambian dependiendo

del contexto social o no-social, conducta que desaparece en los animales tipo-TEA, mostrando una asociación entre la ejecución motora y la percepción de claves relevantes del contexto social. Entonces, para estudiar el papel de la percepción en el desarrollo de la sociabilidad, hemos realizado un test de PMB junto con el TS3C en ratones infantiles, encontrando una correlación entre la PMB y la sociabilidad ($p=0,0072$, $r=0,8810$), la que se pierde en el modelo TEA ($p=0,7520$, $r=0,1429$), al mismo tiempo que se pierde la discriminación contextual de los parámetros “detenciones” y “distancia/detención”. Estos resultados sugieren que la alteración de una función neuropsicológica de alto nivel, como la ToM, se sustenta en el desarrollo discordante de funciones de menor orden, probablemente más temprano en el desarrollo.

ActivaMente: intervención cognitiva multimodal para la preservación funcional en enfermedad de Parkinson

Gabriela Cáceres-Luna¹, Marcio Soto-Añari¹, María del Carmen González¹, José Centeno Arispe²

¹Universidad Católica San Pablo

²Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza

El deterioro cognitivo asociado a la enfermedad de Parkinson representa un desafío clínico significativo, afectando principalmente la atención, la memoria y las funciones ejecutivas. En este contexto, las intervenciones no farmacológicas basadas en estimulación cognitiva han cobrado relevancia; sin embargo, su sistematización y evaluación en contextos locales siguen siendo limitadas. El presente trabajo describe el diseño e implementación de un programa estructurado de estimulación cognitiva domiciliar dirigida a adultos con diagnóstico de Parkinson. El programa, denominado ActivaMente, tiene como objetivo preservar y fortalecer los procesos cognitivos mediante un enfoque multimodal y

progresivo. Se desarrolla a lo largo de 16 semanas, con una frecuencia de dos sesiones domiciliarias por semana y una sesión grupal mensual. La intervención se organiza en cuatro fases: estimulación de la atención (semanas 1-4), memoria (semanas 5-8), funciones ejecutivas (semanas 9-12) e integración funcional (semanas 13-16). Las actividades están diseñadas para realizarse en casa mediante cuadernillos estructurados, incorporando ejercicios de complejidad creciente orientados a la aplicación en la vida cotidiana. El programa incluye un sistema de monitoreo continuo mediante evaluaciones pre y post intervención, registro semanal de desempeño y estrategias de retroalimentación, así como componentes

de psicoeducación para pacientes y cuidadores, con el fin de favorecer la adherencia y generalización de los aprendizajes. Se espera que esta propuesta contribuya a la preservación de la autonomía funcional y la ralentización del deterioro cognitivo, aportando un modelo

replicable y contextualizado de intervención neuropsicológica en enfermedad de Parkinson.

Palabras clave: estimulación cognitiva, enfermedad de Parkinson, funciones ejecutivas, intervención no farmacológica, neuropsicología.

Desempeño cognitivo y funcional en una muestra de adultos mayores: Una aproximación desde un programa multimodal de envejecimiento activo

Chris Portugal-Díaz¹, Rossmery Arce¹, Claudia Rivera-Fernández², Marcio Soto-Añari¹

¹Universidad Católica San Pablo, Perú.

²Universidad Nacional de San Agustín, Perú.

El envejecimiento poblacional constituye uno de los principales desafíos para los sistemas de salud, particularmente en contextos latinoamericanos donde la evidencia sobre intervenciones en envejecimiento activo es aún limitada. El presente estudio tuvo como objetivo examinar el desempeño cognitivo y funcional en adultos mayores participantes de un programa multimodal de envejecimiento activo, en comparación con un grupo no expuesto. Se empleó un diseño cuasiexperimental de comparación entre grupos con medición posttest. La muestra estuvo conformada por 31 adultos mayores participantes del programa y 40 controles, apareados por edad y años de escolaridad. Se evaluaron la funcionalidad (T-ADLQ), cognición global (MoCA), funciones ejecutivas (Wisconsin Card Sorting Test), memoria verbal (Hopkins Verbal Learning Test), habilidades visoespaciales (Figura Compleja de Rey) y sintomatología depresiva (PHQ-9). Los resultados

evidenciaron un menor rendimiento en cognición global en el grupo participante en comparación con el grupo control ($p < .001$), sin diferencias significativas en memoria ni habilidades visoespaciales. Asimismo, se observaron asociaciones significativas entre funcionalidad, edad, nivel educativo y desempeño cognitivo. Estos hallazgos sugieren la influencia de factores de selección y la heterogeneidad de los perfiles clínicos en programas de intervención. Se concluye que, si bien los programas multimodales representan una estrategia prometedora, es necesario fortalecer su evaluación mediante diseños longitudinales y controlados. Este estudio contribuye con evidencia empírica en un contexto subrepresentado, destacando la importancia de desarrollar intervenciones basadas en evidencia para promover un envejecimiento saludable.

Palabras clave: envejecimiento activo, cognición, funcionalidad, adultos mayores, intervención multimodal.

NeuroBreve: batería de cribado lingüístico para la detección precoz del deterioro cognitivo en adultos mayores hispanohablantes

José M. Caramés, Geidy Bermúdez-Llusá y José A. Adrián

Universidad de Málaga (España) y Asociación de Familiares de Alzheimer de Málaga (AFA Málaga, España)

La detección precoz del deterioro cognitivo sigue siendo un reto clínico relevante. Aunque la memoria ha sido el principal foco de investigación como marcador temprano, las alteraciones del lenguaje pueden aportar indicadores precoces con valor diagnóstico. Objetivo: Presentar NeuroBreve, una prueba breve de cribado dirigida a detectar alteraciones cognitivo-lingüísticas compatibles con deterioro cognitivo leve (DCL)

y enfermedad de Alzheimer (EA) en fases iniciales, en contextos clínicos y comunitarios. Método: NeuroBreve se desarrolló mediante la selección de las tareas lingüísticas con mayor capacidad discriminativa del protocolo NeuroBel, atendiendo a criterios teóricos, empíricos y clínicos, con el fin de reducir el tiempo de administración sin comprometer su utilidad diagnóstica. Evalúa, a través de tareas de producción, comprensión y fluidez

verbal, procesos de acceso léxico, integración semántica y planificación morfosintáctica. Se administró a una muestra piloto de 20 participantes distribuidos en tres grupos: EA, DCL y controles. Resultados: NeuroBreve mostró diferencias significativas entre grupos ($p < .001$; ANOVA con comparaciones post hoc de Bonferroni), lo que indica sensibilidad global al deterioro cognitivo. El análisis ROC mostró buena capacidad discriminativa

para diferenciar EA de controles ($AUC = 0,887$) y EA de DCL ($AUC = 0,887$), mientras que la discriminación entre DCL y controles fue más limitada ($AUC = 0,581$). El tiempo de administración fue de 15-20 minutos. Conclusión: NeuroBreve se perfila como una herramienta breve, prometedora y de utilidad clínica para el cribado de alteraciones cognitivo-lingüísticas, especialmente en fases iniciales de EA.

Relación entre los niveles de cortisol salival, calidad del sueño y memoria de trabajo en universitarios que combinan estudio y jornada laboral.

Guadalupe Getsemaní Velázquez Díaz, Mónica Valdez Martín del Campo, Aurora Alviso Rodríguez, María René Reséndiz Vázquez, Emiliano Fonseca Vázquez, Emerson Alejandro Vasquez Leos.

Licenciatura en Psicología. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

El estrés es una respuesta adaptativa ante demandas percibidas como desafiantes, que activa recursos fisiológicos y conductuales para afrontar exigencias contextuales. En niveles moderados, favorece la adaptación al entorno y el desempeño en contextos demandantes; sin embargo, cuando se vuelve crónico, puede afectar la salud, el sueño y algunas funciones cognitivas. Por lo anterior, esta investigación tuvo como objetivo analizar la correlación entre cortisol salival, memoria de trabajo y calidad del sueño. Participaron 18 estudiantes universitarios laboralmente activos; 6 hombres y 12 mujeres con edades entre 18 y 25 años. Se aplicaron el Índice de Calidad del Sueño de Pittsburgh (ICSP) y las subpruebas "Retención de Dígitos" y "Sucesión de Números y Letras" de la Escala de Inteligencia de Wechsler para Adultos (WAIS-IV). Para la medición de cortisol se recolectó

una muestra de saliva y se analizó mediante un ensayo de inmunoadsorción enzimática (ELISA). Se observaron variaciones en los niveles de cortisol entre los participantes según el sexo, identificando un mayor nivel de cortisol en las mujeres ($M=14.814 \mu\text{g/dL}$, $H=13.133 \mu\text{g/dL}$). No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre las principales variables de interés: cortisol, calidad del sueño y memoria de trabajo (todos los valores de $p > 0.05$). Se identificó una correlación estadísticamente significativa entre calidad del sueño y horas de estudio ($r = 0.425$, $p = 0.048$).

La ausencia de correlaciones estadísticamente significativas se discute en términos de la homogeneidad de los datos y el reducido tamaño de la muestra. Para futuras investigaciones se propone agregar grupos de comparación.

Programa Ritmo vers. 1.0 como estrategia de estimulación cognitiva: evaluación de su efectividad en el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la atención en niños con TDAH

Isabella Anteliz Mendoza, Sharon Nicolle Castro Castaño, Natalia Suárez Yepes

Universidad Autónoma del Caribe.
Barranquilla, Colombia.

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad del programa de estimulación cognitiva Ritmo vers. 1.0 como estrategia para fortalecer el control inhibitorio, la atención y la memoria de trabajo en niños con Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). Para ello, se describió el desempeño cognitivo de los participantes antes de la intervención, se analizaron los cambios producidos tras su implementación y se compararon los resultados entre un grupo experimental y un grupo control mediante un diseño experimental con mediciones pre y post intervención. El programa se fundamenta en la teoría de la sincronización neural y en la *Dynamic Attending*

Theory, que plantean que el ritmo musical favorece la organización temporal de la actividad cerebral y la regulación de los procesos atencionales. La intervención incorporó actividades rítmicas con variaciones de tempo y presentación impredecible de estímulos para estimular la atención sostenida, la inhibición de respuestas impulsivas y la memoria de trabajo. Los resultados evidenciaron mejoras estadísticamente significativas en el grupo experimental en el control inhibitorio, la atención y la memoria de trabajo, tanto visual como auditiva, en comparación con el grupo control. Asimismo, se observaron incrementos en la precisión de las respuestas, una

reducción de errores y una mayor estabilidad en el rendimiento atencional, aunque con una ligera disminución en la velocidad de procesamiento. También se registraron mejoras en la aptitud musical, lo que respalda que los cambios observados fueron consecuencia de la intervención. En conclusión, **Ritmo vers. 1.0** constituye una intervención válida y efectiva para potenciar funciones ejecutivas en niños con TDAH. Sus fundamentos teóricos, metodología estructurada y resultados empíricos respaldan su aplicación como herramienta complementaria en contextos educativos y terapéuticos para favorecer el desarrollo cognitivo y la autorregulación.

Decisiones Morales en Adolescentes Infractores

Isabella Pugliese Cortés¹, Juan Camilo Tovar², Daniela Moreno Arrieta¹, Elena Cárdenas¹, Valeria Saray¹, Claudia Idárraga³, Mariana Pino⁴, Sandra Báez¹

¹ Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. ² Zoológico de Barranquilla, Barranquilla, Colombia. ³ Universidad Metropolitana de Barranquilla, Barranquilla, Colombia. ⁴ Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, Barranquilla, Colombia.

Objetivos: Examinar diferencias en el procesamiento de la intención y el daño en juicios morales entre adolescentes infractores y controles, distinguiendo acciones intencionales y accidentales, así como daños por acción y por omisión. **Método:** 73 adolescentes infractores y 56 controles completaron una tarea de decisiones morales con 24 situaciones hipotéticas: 12 describían daños intencionales (6 por acción y 6 por omisión) y 12 daños accidentales (6 por acción y 6 por omisión). Tras cada escenario, evaluaron en una escala Likert de 7 puntos la moralidad de la conducta, la intencionalidad atribuida, el castigo merecido y la magnitud del daño. Se realizaron ANOVAs mixtos 2 (intencional vs. accidental) x 2 (acción vs. omisión) x 2 (infractores vs. controles) para cada medida. **Resultados:** En la muestra total se replicó el efecto de magnificación del daño intencional: las

acciones intencionales fueron juzgadas como más inmorales y merecedoras de mayor castigo que las accidentales. No obstante, los infractores mostraron un patrón diferencial, con mayor atribución de intencionalidad y mayor severidad punitiva ante daños accidentales en comparación con los controles. También asignaron castigos más altos a conductas intencionales. No se hallaron diferencias significativas entre acción y omisión. **Conclusiones:** Los adolescentes infractores presentan mayor severidad en el juicio moral, especialmente frente a daños accidentales, lo que sugiere una tendencia a sobretribuir intención dañina. Este patrón podría reflejar alteraciones en la inferencia de estados mentales y en la integración entre intención y resultado, constituyendo un posible mecanismo cognitivo subyacente a la conducta antisocial en la adolescencia.

Protocolo de rehabilitación neuropsicológica de la función ejecutiva y cognición social en pacientes con trastorno por consumo de alcohol

Angelica María Rivera Bayona, Jairo R. Rincones Pérez

Hospital Carisma
Universidad CES

El trastorno por consumo de alcohol (TCA) constituye un problema de salud pública por su asociación con alteraciones cognitivas que comprometen la autorregulación, la toma de decisiones y la interacción social. Entre los déficits más relevantes se encuentran el deterioro del control inhibitorio y las dificultades en cognición social, condiciones que favorecen la impulsividad, disminuyen la adherencia terapéutica y aumentan el riesgo de recaída. En este contexto, el presente trabajo expone el diseño de un protocolo de rehabilitación neuropsicológica orientado a la restauración de la función ejecutiva y la cognición social en pacientes con TCA. La elaboración del protocolo se desarrolló a partir de una revisión de la literatura, la definición de objetivos terapéuticos, la selección de técnicas de intervención y la estructuración del programa. Su fundamento teórico se apoya en la rehabilitación cognitiva como estrategia para recuperar

competencias deterioradas y optimizar el funcionamiento cotidiano. Asimismo, incorpora intervenciones complementarias basadas en mindfulness, regulación emocional y entrenamiento en habilidades sociales, bajo un enfoque individualizado según las necesidades cognitivas de cada paciente. Particularmente, se plantea su aplicación clínica en adultos jóvenes. Se espera que la implementación del protocolo favorezca la recuperación cognitiva, mejore la calidad de vida, fortalezca el autocontrol y reduzca la probabilidad de recaída, al tiempo que promueva mayor adherencia al tratamiento. En conclusión, la rehabilitación neuropsicológica de la función ejecutiva y la cognición social constituye una propuesta clínicamente pertinente para abordar déficits frecuentemente desatendidos en personas con trastorno por consumo de alcohol y contribuir a optimizar sus resultados terapéuticos.

Relación entre la sobrecarga del cuidador y el reconocimiento emocional en cuidadores de adultos mayores con y sin deterioro cognitivo

Camilo Achury, Isis Prada, Miguel Franco, Cristina Pinto, Susana Lozano.

Fundación Universitaria para las Ciencias de la Salud (FUCS) – Instituto para las Neurociencias y la Salud (IN&S)

El objetivo del estudio es determinar la relación entre la sobrecarga y la capacidad de reconocimiento emocional en cuidadores de adultos mayores. Método: Estudio correlacional. Participantes: 50 cuidadores de adultos mayores que asistieron a consulta externa al IN&S, edad media de 53 años. Instrumentos: Entrevista estructurada, Escala de Sobrecarga del Cuidador Zarit, Prueba de Evaluación del Reconocimiento Emocional (PERE) que evalúa: Alegría, Tristeza, Enfado, Sorpresa, Miedo, Asco y Neutra. Resultados: El 78% son cuidadores informales y el 12% formales. Los cuidadores en su mayoría fueron familiares directos (85%). El 26% de los cuidadores consideran que presentan sobrecarga, mientras que el 65% no reportan una sobrecarga significativa. Las

emociones con menor tasa de reconocimiento fueron miedo (: 2,28), tristeza (: 4,98), enfado (: 6,74) y asco (: 6,78). Se encuentra correlación entre el ZARIT y tristeza ($p: 0,632$), miedo ($p: 0,635$) y asco ($p: 0,815$). Conclusiones: Se confirma en este estudio lo hallado en reconocimiento emocional de personas sin patologías, siendo las emociones menos reconocibles, las emociones negativas, particularmente miedo y tristeza. Igualmente, se confirma la relación entre el reporte de sobrecarga con las emociones negativas, particularmente el asco. Se proponen nuevos estudios para evaluar la influencia que tienen las variables sobre la sobrecarga y otras variables cognitivas y clínicas en el cuidador, así como el análisis de dichas relaciones desde las neurociencias afectivas.

Regional Quantitative Susceptibility Mapping and Trail Making Test Performance in Mild Cognitive Impairment

Edanilka Medina-Sustache, Héctor M. Gómez-Martínez

Universidad Carlos Albizu, SJ

Objetivos: To examine associations between regional quantitative susceptibility mapping (QSM) and Trail Making Test performance (TRABSCOR) in Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) participants, with emphasis on differences by diagnostic group. **Method:** MRI-QSM, demographic, and cognitive data were integrated. Analyses were restricted to one observation per participant using the first visit with complete data. Stratified analyses were conducted in cognitively normal participants (CN; $n = 134$; mean age = 75.95 years, SD = 7.80; 66.4% female) and individuals with mild cognitive impairment (MCI; $n = 65$; mean age = 77.34 years, SD = 6.88; 41.5% female). The Alzheimer's disease group was excluded from inferential analyses due to insufficient sample size ($n = 1$). Bivariate correlations and multiple

linear regression models adjusted for age, education, and sex were computed. **Results:** No significant associations between regional QSM and TRABSCOR were observed in the CN group. In the MCI group, significant inverse bivariate associations emerged for left prefrontal ($r = -.314$, $p = .011$), left orbitofrontal ($r = -.246$, $p = .049$), and right medial temporal QSM ($r = -.338$, $p = .006$). Adjusted regression models confirmed that these regions significantly predicted TRABSCOR: left prefrontal ($B = -13.482$, $\beta = -.249$, $p = .038$), left orbitofrontal ($B = -3.902$, $\beta = -.239$, $p = .042$), and right medial temporal ($B = -5.503$, $\beta = -.282$, $p = .028$). **Conclusions:** Regional QSM-TRABSCOR associations were specific to MCI, suggesting that magnetic susceptibility may reflect early cognitive vulnerability in frontal and medial temporal networks.

Optimización y Validación Técnica de la Calificación Automatizada de las Baterías ENI-2, NEUROPSI y BANFE

Juan Manuel Torres Sepúlveda, Leidy Tatiana Echeverría Cupa, Diana Sofía Díaz Barrera, Yazmin Adriana Sánchez Ortiz

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Objetivos: Validar la precisión técnica y evaluar la eficiencia operativa de un prototipo de procesamiento computacional diseñado para la calificación normativa de las baterías Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI-2), NEUROPSI: Atención y Memoria, y la Batería de Funciones Ejecutivas y Lóbulos Frontales (BANFE). **Método:** Se desarrolló una herramienta basada en lógica algorítmica para la conversión de puntajes brutos a escalas normativas. El estudio siguió un diseño de validación de doble fase: 1) Simulación estocástica (Monte Carlo) con 1,000 perfiles sintéticos para auditar la robustez del sistema ante diversas combinaciones de puntaje; 2) Prueba piloto con protocolos anonimizados del Laboratorio de Procesos Básicos (UPTC), contrastando la calificación manual frente al procesamiento automatizado. **Resultados:** La

simulación confirmó una alta consistencia algorítmica ($CCI > 0.99$) respecto a los baremos de referencia. En la prueba piloto, la automatización redujo el tiempo de ejecución en un 85% e identificó discrepancias aritméticas en el 10% de los protocolos manuales, optimizando la detección de errores de transposición y consulta de tablas. **Conclusiones:** La automatización constituye un soporte técnico robusto para la investigación académica, garantizando la integridad de los datos normativos. Este prototipo permite desplazar la carga mecánica hacia procesos de mayor valor clínico, como la interpretación e intervención. De este modo, se optimizan los recursos del evaluador bajo un marco de transparencia ética y uso para el ámbito de la investigación institucional, sin fines de comercialización.

Predictores del funcionamiento cognitivo en una muestra de cuidadores informales de personas viviendo con demencia

Juan Sebastián Ramírez (1), Maríajosé Castañeda (1), Daniela Moreno (1), Mariana Fajardo (1), Daniel Fager (1), Eva Cordobez (1), Alejandra Peña (1), Claire Guillan (2), Agustín Ibañez (3), María Fernanda Reyes (1), Sandra Báez (1).

Universidad de Los Andes (1); Trinity College (2); Universidad Adolfo Ibáñez (3).

Objetivo: Identificar las variables sociodemográficas y psicológicas que predicen el funcionamiento cognitivo de cuidadores informales de personas que viven con demencia. **Método:** Se evaluaron 154 cuidadores informales de personas con demencia en Bogotá mediante un protocolo que incluyó variables sociodemográficas (edad, tiempo ejerciendo el cuidado, nivel educativo y nivel socioeconómico) y medidas de sobrecarga, necesidades familiares, afecto positivo y negativo, aspectos positivos del cuidado, satisfacción con la vida, bienestar psicológico, ansiedad, depresión, soledad y apoyo social. El funcionamiento cognitivo se midió con la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) y la funcionalidad del paciente con el índice de Barthel. Se realizaron correlaciones bivariadas y una regresión múltiple jerárquica con el MoCA como variable dependiente para estimar el aporte incremental de los bloques de variables. **Resultados:**

El mejor desempeño cognitivo se asoció significativamente con menor edad, mayor nivel educativo, menos años dedicados al cuidado y mayor apoyo social percibido. De manera inesperada, mayores puntuaciones en aspectos positivos del cuidado se relacionaron con menor rendimiento cognitivo. En contraste, la sobrecarga, los síntomas depresivos y ansiosos, la soledad, el afecto negativo, el bienestar psicológico, el nivel socioeconómico y la funcionalidad de la persona con demencia no predijeron el desempeño cognitivo en el modelo final. **Conclusiones:** El funcionamiento cognitivo de los cuidadores informales parece estar más vinculado a recursos estructurales y contextuales, como la educación y el apoyo social, que al malestar emocional asociado al cuidado. Estos hallazgos cuestionan la noción de que la carga psicológica sea el principal determinante del deterioro cognitivo en cuidadores.

Alteraciones funcionales en la corteza prefrontal ventromedial asociadas al fenotipo de desinhibición en adultos con Trastorno de la Personalidad Antisocial: Una revisión sistemática de fMRI.

Julieth Vanessa Cerón

Universidad del Valle, Sede Palmira, Colombia.

El propósito de esta investigación es sintetizar la evidencia científica para objetivar el sustrato biológico de la desinhibición en adultos con Trastorno de la Personalidad Antisocial. Al abordar las alteraciones funcionales en la corteza prefrontal ventromedial identificadas mediante fMRI, el estudio analiza constructos neurocognitivos como el control inhibitorio y el modelo de Control Inhibitorio descendente. Metodológicamente, se realizó una revisión sistemática cualitativa con síntesis narrativa siguiéndolos estándares PRISMA 2020 para garantizar replicabilidad. La búsqueda en las bases de datos PubMed, ScienceDirect y Scielo incluyó estudios empíricos en adultos de contextos clínicos y penitenciarios, evaluando el uso de fMRI con contraste BOLD, tomografía por emisión de positrones, electroencefalografía e instrumentos de evaluación neuropsicológica

convencional. Los resultados demuestran una convergencia significativa en la evidencia donde la desinhibición se asocia a una deficiencia estructural y funcional, caracterizada por hipoactividad en la vmPFC e hiperactividad en la amígdala. El contraste literario identificó una brecha metodológica relevante, pues mientras la investigación internacional emplea neuroimagen para obtener biomarcadores objetivos, el contexto colombiano se fundamenta en psicometría convencional, la cual presenta limitaciones técnicas frente a la detección de la distorsión deliberada o simulación. En conclusión, la falla en los circuitos inhibitorios constituye una realidad anatómica innegable. Estos hallazgos justifican integrar la fMRI en la evaluación forense, transitando de dictámenes conductuales subjetivos a diagnósticos basados en neurociencia objetiva.

Inhibición y flexibilidad cognitiva como predictoras del deterioro cognitivo leve en personas con enfermedad de Parkinson.

Karen Andrea González Ladrón de Guevara, Erick Israel Medina Correa, Rodolfo Solís Vivanco

Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Ciudad de México, México.

En la enfermedad de Parkinson (EP), las alteraciones en funciones ejecutivas como la inhibición y la flexibilidad cognitiva constituyen características centrales del deterioro cognitivo leve (DCL-EP). El Five Digit Test (FDT) es un instrumento neuropsicológico ampliamente empleado para su evaluación; no obstante, su utilidad como herramienta de screening en DCL-EP no ha sido claramente establecida. Objetivo: explorar la capacidad de los índices de Inhibición (iIn) y de Flexibilidad (iF) del FDT para la detección temprana del DCL-EP en una muestra mexicana con EP. Se realizó un estudio retrospectivo con 136 personas con EP. El DCL-EP se diagnosticó mediante una batería neuropsicológica completa, promediando las subpruebas en un índice de cognición global (gZ). Se

identificaron 66 participantes con cognición normal (CN) y 70 con DCL-EP. El grupo con DCL-EP presentó menor puntuación en los índices de iIn ($p = .006$) e iF ($p = <.001$) que el grupo con CN. Se observó una correlación negativa entre ambos índices y el gZ (iIn: $r_s = -.309$, $p < .001$; iF: $r_s = -.514$, $p < .001$). La curva ROC del iIn mostró una sensibilidad 57.1% y especificidad 72.7%, mientras el iF presentó una sensibilidad 55.7% y especificidad 66.7%. En conclusión, El FDT reveló que el déficit en iF tuvo mayor tamaño de efecto que el iIn, correlacionó con cognición global y mostró capacidad aceptable para descartar DCL. Estos resultados apoyan el uso del FDT, particularmente el iF, como herramienta de apoyo para el screening de la disfunción cognitiva temprana en la EP.

Utilidad de la Figura Compleja de Rey como herramienta de screening en personas con Enfermedad de Parkinson con y sin deterioro cognitivo.

Padilla Bustos K., Correa-Medina E. I., Rodríguez Agudelo O. Y., Puga González A. F., Solís-Vivanco R.

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, Ciudad de México, México.

Introducción: Las alteraciones en la visoespacialidad y visoconstrucción en personas con Enfermedad de Parkinson (EP) son una característica clínica frecuente ante la presencia de deterioro cognitivo leve (DCL). La copia de Figura Compleja de Rey-Osterrieth (C-FCRO) es una herramienta neuropsicológica utilizada con frecuencia para medir dichas alteraciones en EP. El objetivo de este estudio consistió en analizar la capacidad discriminativa de la copia de la Figura Compleja de Rey-Osterrieth (C-FCRO) como herramienta de screening para la detección de DCL en personas mexicanas con EP (DCL-EP). **Método:** Se realizó un estudio retrospectivo en 127 personas con EP (edad 60.27 ± 9.98 ; escolaridad 11.90 ± 4.76 ; años de evolución 8.81 ± 5.74). El diagnóstico de DCL se realizó de acuerdo con los criterios de la Movement Disorder Society (MDS) mediante una batería neuropsicológica completa y se utilizó el promedio de los valores Z de cada subprueba para obtener un índice de funcionamiento cognitivo global (gZ). Se comparó

el rendimiento de la C-FCRO entre grupos mediante t de Student, se analizó su correlación con el gZ usando r de Pearson y se exploró su capacidad como herramienta discriminativa del DCL-EP mediante análisis de curva ROC. **Resultados:** Los resultados de la batería neuropsicológica permitieron identificar a 58 personas con EP (45.7%) que se ubicaron en el grupo de cognición normal (CN) y 69 (54.3%) en grupo de DCL-EP. La puntuación en la FCRO fue significativamente mayor en el grupo de CN (31.99 ± 4.17), comparado con el grupo con DCL-EP (28.24 ± 6.43 ; $t(125) = 3.821$, $p < .001$, $d = 0.681$). Se observó una correlación positiva entre FCRO y gZ ($r = 0.572$, $p < .001$). La curva ROC mostró un AUC de 0.712, con sensibilidad 62.3% y especificidad 72.4%. **Conclusiones:** La C-FCRO mostró una capacidad discriminativa modesta para identificar DCL en esta muestra, similar a lo reportado por Biundo et al. (2013). Estos hallazgos sugieren que la prueba debe interpretarse con cautela dentro de una evaluación neuropsicológica más amplia.

Protocolo de estimulación Neuropsicológica en Flexibilidad Cognitiva y Control Inhibitorio para pacientes entre los 7 a 10 años con Epilepsia de Ausencia Infantil de la ciudad de Medellín

Laura Marcela Cortes Yepes, Manuela Moreno Lopera, Mónica María Escobar Villegas,
Jessica Alejandra Villa Moscoso

Universidad CES – Maestría en Neuropsicología Clínica, Medellín, Colombia

La OMS (2019) define la epilepsia como “una enfermedad cerebral crónica no transmisible caracterizada por crisis recurrentes debidas a descargas eléctricas excesivas de grupos de neuronas en el cerebro” la cual puede tener secuelas neurológicas, cognitivas, psicológicas y sociales (McWilliam et al., 2024). La epilepsia de ausencia infantil (EAI) es un síndrome epiléptico idiopático (genético) generalizado, es común en niños normales en edad escolar entre las edades de 4 y 10 años (edad pico de 6 a 7 años). Se manifiesta con crisis de ausencia típicas graves y frecuentes de inicio y terminación abrupta, con una duración de alrededor de 10 segundos cada una, muchas veces al día. Esta condición genera un impacto no solo en la calidad de vida del paciente y en la de quienes lo rodean, sino que

además involucra alteraciones a nivel cognitivo y emocional. La EAI puede afectar las funciones ejecutivas, entre ellas la flexibilidad cognitiva y control inhibitorio, las cuales competen en este trabajo. El objetivo es diseñar e implementar un protocolo de estimulación neuropsicológico orientado a fortalecer las funciones ejecutivas de flexibilidad cognitiva y control inhibitorio en paciente entre 7 y 10 años con EAI, residentes en la ciudad de Medellín, así como psicoeducar a las familias sobre el diagnóstico y sus implicaciones por medio de un programa de estimulación de 16 sesiones, basado en el modelo de funciones ejecutivas en niños de Diamond (2013), y un plan de manejo en casa, pensadas en las necesidades del paciente con base en su diagnóstico, contexto social y académico.

Ruido Ambiental y Toma de Decisiones: Modulación del Estrés sobre Elecciones Intertemporales y de Riesgo desde una Perspectiva Neuropsicofisiológica

Jorge Alexander Ríos-Flórez, Laura María Guarín-Ceballos, Andrés García-Arenas, Daniel Navarro-Castro, Emmanuel Vásquez-Sierra, Melissa Urrego-Montoya, Carlos Andrés Sáenz-Peña, Juanita García-Giraldo, Andrés Camilo Salamanca-Galindo, Sara Isabel Negrete-Peláez, Mateo Alexander Henao-Tavera, José Miguel Pérez-Jiménez, David Santiago-Vivares Serna, Leidy Parra Restrepo.

Politécnico Grancolombiano Institución Universitaria, Medellín.

El ruido ambiental representa un estresor frecuente en entornos urbanos, con capacidad de influir en funciones cognitivas complejas como la toma de decisiones. Este estudio tuvo como propósito examinar el efecto del estrés generado por ruido ambiental sobre la toma de decisiones intertemporales y de riesgo, mediante la integración de indicadores conductuales y psicofisiológicos. Se llevó a cabo una investigación de enfoque cuantitativo con diseño experimental de grupos independientes (N = 124 adultos jóvenes). El grupo experimental fue expuesto a ruido ambiental simulado (85–90 dB), mientras que el grupo control realizó las mismas tareas en condiciones de silencio. Se utilizaron el Iowa Gambling Task (IGT), el Monetary Choice Questionnaire (MCQ) y la Escala de Estrés Percibido (EEP-14), junto con el registro de la frecuencia cardíaca

en cinco momentos del protocolo. Los hallazgos indican que la exposición al ruido se relaciona con un incremento en la activación fisiológica y con una mayor tendencia hacia decisiones impulsivas, evidenciada en la preferencia por recompensas inmediatas y cambios en la propensión al riesgo ($p < .05$). Además, se observaron asociaciones entre la activación fisiológica y el desempeño en las tareas de decisión. En esta vía, el estrés inducido por ruido ambiental parece influir en los procesos decisionales, promoviendo respuestas más impulsivas bajo estados de elevada activación autonómica. Estos resultados subrayan la importancia de considerar variables contextuales ecológicamente relevantes en el análisis del comportamiento humano y plantean implicaciones para los ámbitos clínico, educativo y de salud pública.

Biomarcadores para la Evaluación de la Efectividad del Tratamiento Farmacológico del TDAH. Una Revisión Narrativa

Laura Valentina Martínez Leuro, Johanna Andrea Folleco Eraso

Laura Valentina Martínez Leuro es psicóloga egresada de la Fundación Universitaria los Libertadores

Johanna Andrea Folleco Eraso es docente titular del programa de psicología de la Fundación Universitaria los Libertadores

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno heterogéneo y complejo. No existe ninguna prueba neuropsicológica que, por sí solo, sea lo suficientemente sensible y confiable para establecer el diagnóstico; por ende en el proceso se deben involucrar no solo más pruebas sino también otras fuentes de información. Los biomarcadores constituyen criterios objetivos que brindan información útil no solo para fortalecer la evaluación diagnóstica, sino también para evaluar la respuesta al tratamiento farmacológico que generalmente apela al uso de metilfenidato y atomoxetina. Esta revisión narrativa identifica los biomarcadores que han sido estudiados para la evaluación de la eficacia del tratamiento farmacológico, a partir de la consulta de artículos originales disponibles en las bases de datos PubMed, ScienceDirect y Taylor & Francis. Se

analizaron 17 estudios cuyos participantes fueron menores de edad diagnosticados con TDAH y tratados con uno de los dos fármacos. Los resultados se agruparon en tres tipos de biomarcadores: biológicos, psicofisiológicos e imagenológicos, y se analizó la relación entre estos y variables como edad, sexo y comorbilidades. Se encontraron cambios en redes corticales, en estructuras cerebrales y una activación discreta de áreas frontales, en relación con la utilidad del tratamiento. También se evidenciaron variaciones en los protocolos de administración del fármaco y ausencia de evaluación de especificidad y sensibilidad del biomarcador. En el ámbito clínico resulta pertinente comprender a la salud mental y la psicopatología a partir de la integración de diferentes unidades de análisis y a través de diferentes dominios de funcionamiento neuroconductual.

Evaluating the Utility of the 5-Cog for Detecting Cognitive Impairment in a Hispanic Population

Marela Firpi Gonzalez, PsyD, Marnina Stimmel, PhD, Emmeline Ayers MPH, Joe Verghese, M.B.B.S. Erica F. Weiss, PhD

Background: Early identification of cognitive impairment in Hispanics/Latinos is essential for effective clinical intervention. It requires culturally/linguistically appropriate tools particularly given access and language barriers in the United States. The 5-Cog is a brief cognitive measure composed of 3 tasks (Picture-based Memory Impairment Screen, Symbol Match, and Motoric Cognitive Risk assessment) developed in the Bronx, NY, USA to screen for cognitive impairment. We explored the efficacy of the 5-Cog as compared with established cognitive measures in Spanish speakers. Methods: The 5-Cog study recruited adults 65+ with cognitive concerns from a primary care practice (full methods elsewhere). This substudy looked at Spanish speaking patients who completed the 5-Cog, neuropsychological testing (NPT), and the MOCA-Blind (Max Score:22). Diagnosis of Subjective Cognitive Complaints (SCC), Mild Cognitive Impairment

(MCI), and Dementia were independently derived from the NPT. Statistical analysis included Fisher's exact test and t-tests comparing 5-Cog with those objective cognitive estimates. Results: 130 individuals evaluated in Spanish (72% female, mean age 71.9 (SD=5.5), mean education of 10.1 (SD=4.5), 52% self-identified Dominican, 28% Puerto Rican) of whom 81 were diagnosed with SCC and 49 with MCI. 5-Cog Positivity (worse performance) was significantly associated with MCI (one-tailed, $p=.03$). The MoCA-Blind ($N=129$) was significantly lower in individuals with 5-Cog Positivity (11.1(SD 3.3) versus 13.9(SD 3.0), $p<.001$). Conclusions: In Hispanics with cognitive concerns in primary care, the 5-Cog was associated with performances on established cognitive measures suggesting that it can be a culturally and linguistically appropriate tool for identifying possible cognitive impairment in this population.

Predictores del funcionamiento cognitivo en una muestra de cuidadores informales de personas viviendo con demencia

María José Castañeda (1), Juan Sebastián Ramírez (1), Daniela Moreno (1), Mariana Fajardo (1), Daniel Fager (1), Eva Cordobez (1), Alejandra Peñata (1), Claire Guilan (2), Agustín Ibañez (3), María Fernanda Reyes (1), Sandra Báez (1).

Universidad de Los Andes (1); Trinity College (2); Universidad Adolfo Ibañez (3).

Objetivo: Identificar las variables sociodemográficas y psicológicas que predicen el funcionamiento cognitivo de cuidadores informales de personas que viven con demencia. **Método:** Se evaluaron 154 cuidadores informales de personas con demencia en Bogotá mediante un protocolo que incluyó variables sociodemográficas (edad, tiempo ejerciendo el cuidado, nivel educativo y nivel socioeconómico) y medidas de sobrecarga, necesidades familiares, afecto positivo y negativo, aspectos positivos del cuidado, satisfacción con la vida, bienestar psicológico, ansiedad, depresión, soledad y apoyo social. El funcionamiento cognitivo se midió con la Evaluación Cognitiva de Montreal (MoCA) y la funcionalidad del paciente con el índice de Barthel. Se realizaron correlaciones bivariadas y una regresión múltiple jerárquica con el MoCA como variable dependiente para estimar el aporte incremental de los bloques de variables. **Resultados:**

El mejor desempeño cognitivo se asoció significativamente con menor edad, mayor nivel educativo, menos años dedicados al cuidado y mayor apoyo social percibido. De manera inesperada, mayores puntuaciones en aspectos positivos del cuidado se relacionaron con menor rendimiento cognitivo. En contraste, la sobrecarga, los síntomas depresivos y ansiosos, la soledad, el afecto negativo, el bienestar psicológico, el nivel socioeconómico y la funcionalidad de la persona con demencia no predijeron el desempeño cognitivo en el modelo final. **Conclusiones:** El funcionamiento cognitivo de los cuidadores informales parece estar más vinculado a recursos estructurales y contextuales, como la educación y el apoyo social, que al malestar emocional asociado al cuidado. Estos hallazgos cuestionan la noción de que la carga psicológica sea el principal determinante del deterioro cognitivo en cuidadores.

Estado cognitivo y emocional de las personas mayores institucionalizadas de dos asilos en la ciudad de Barranquilla

Miguel Alberto Montañez Romero, Lisseth Zulay Batista Hernandez, Martha Eugenia Rueda Sibaja

Universidad Metropolitana

El objetivo del estudio fue describir el estado cognitivo y emocional de las personas mayores institucionalizadas y desarrollar una propuesta de intervención integral. Se trabajó con una muestra de 146 personas mayores en dos asilos, aplicando herramientas como el ACER-R, Yesavage, Mini Mental State Examination, MOCA, escala Barthel y escala Lawton y Brody para evaluar aspectos cognitivos, emocionales y de calidad de vida. En términos cognitivos, el ACE-R indicó que el 93.1% de los participantes presentaron deterioro cognitivo o presencia de demencia. La escala de yesavage reveló que un 55% de los residentes manifestaron síntomas moderados de depresión, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Respecto a la calidad de vida las escalas de Lawton y Brody señalaron que

el 65% de los participantes requería asistencia moderada a severa en actividades de la vida diaria, destacando la dependencia en tareas instrumentales. En el análisis correlacional, se identificó una relación significativa entre el deterioro cognitivo y la calidad de vida, evidenciando que a mayor deterioro cognitivo, menor autonomía funcional. El estudio resalta la necesidad de implementar programas integrales que no solo aborden el deterioro cognitivo, sino que también coinciden el impacto emocional y la calidad de vida de las personas mayores institucionalizadas. Se concluye que una intervención multidisciplinar enfocada en la estimulación cognitiva, apoyo emocional y fortalecimiento de la autonomía funcional puede mejorar significativamente el bienestar de esta población.

Efectos cognitivos del Uso de Videojuegos en Población Juvenil: Una revisión de literatura

Miguel Alberto Montañez Romero

Universidad Metropolitana

Esta investigación presenta una revisión bibliográfica orientada a analizar los efectos cognitivos, neurobiológicos y educativos del uso de videojuegos. Las variables analizadas fueron la edad prevalente en el uso de videojuegos, los tipos de videojuegos, tiempo de uso, método utilizado, efectos cognitivos, efectos neurobiológicos y aplicabilidad en campos clínicos y educativos. Se realizó a través de la metodología prisma utilizando bases de datos como: PubMed / Medline, Web of Science (WOS), Scopus, Science Direct y Scielo; se utilizaron criterios como estudios publicados entre 2018 y 2025 que evalúan, efecto a nivel cognitivo, cambios neurobiológicos, efectos en la salud mental y aplicabilidad en el campo educativo. Se obtuvieron un total de 38 artículos científicos, los cuales se organizaron en cuatro núcleos temáticos principales: (1) efectos cognitivos y neurobiológicos, (2) impacto en

niños y adolescentes, (3) aplicaciones educativas y experiencias de gamificación, y (4) revisiones sistemáticas centradas en habilidades metacognitivas. Dentro de los resultados se evidenció que ciertos tipos de videojuegos pueden generar mejoras significativas en funciones cognitivas como la atención, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, además de activar circuitos cerebrales implicados en el aprendizaje por refuerzo, de igual manera que en el ámbito educativo, los videojuegos muestran un alto potencial formativo, favoreciendo la motivación, el pensamiento científico y la autorregulación. Se concluye que el videojuego constituye una herramienta interdisciplinaria con aplicaciones clínicas, educativas y cognitivas, cuyo impacto depende de variables contextuales y del diseño de estrategias de intervención responsables y fundamentadas.

Implicaciones cognitivas del Uso de Videojuegos en Población Juvenil Una revisión de literatura

Miguel Alberto Montañez Romero

Universidad Metropolitana

La investigación estuvo orientada a analizar los efectos cognitivos del uso de videojuegos en población infantil y juvenil. Se realizó una revisión documental apoyándose en la metodología prisma para el análisis de los artículos científicos publicados entre 2018 y 2025, con el objetivo de analizar la relación entre el uso de videojuegos y las funciones cognitivas en población infantil, adolescente. La búsqueda se efectuó en bases de datos académicas de acceso abierto y suscritas (Scopus, Web of Science, PubMed, Dialnet y Google Scholar). Para garantizar la exhaustividad de la búsqueda se emplearon conectores booleanos que permitieron combinar términos y delimitar resultados. Los principales operadores utilizados fueron: AND: para vincular conceptos relacionados (ej. "videojuegos AND funciones cognitivas"), OR: para incluir sinónimos y variantes (ej. "videojuegos OR videojuegos educativos OR gamificación"), NOT: - para excluir términos no pertinentes (ej. "videojuegos NOT gambling"). Las palabras

clave se definieron a partir de los objetivos de la investigación y se organizaron en tres ejes: Videojuegos, Cognición e Impacto/efectos. Resultados: La revisión de estudios sobre videojuegos y funciones cognitivas arrojó seis categorías principales: educativos/gamificados, acción/shooters, simulación/estrategia/mundo abierto, mixtos, activos y uso problemático/adictivo. Los videojuegos educativos y gamificados fueron los más frecuentes, mostrando efectos positivos consistentes en atención, memoria de trabajo, funciones ejecutivas, metacognición y motivación, consolidándose como herramientas pedagógicas. Los videojuegos de acción y simulación se asociaron con mejoras en atención visual, memoria espacial y razonamiento abstracto, aunque su uso intensivo puede generar riesgos de sobreestimulación y bajo rendimiento escolar. Los videojuegos mixtos reflejaron una influencia dual, combinando beneficios en funciones ejecutivas con posibles efectos adversos. Los videojuegos activos,

aunque menos estudiados, mostraron resultados prometedores en la integración de funciones cognitivas y actividad física. Finalmente, el uso problemático o adictivo se vinculó con consecuencias negativas en atención, autorregulación y rendimiento académico, siendo considerado un factor de riesgo para la salud pública en adolescentes. Conclusión, los resultados evidencian que el impacto de los videojuegos sobre las funciones cognitivas es heterogéneo y dependiente del género, el contexto de uso y la regulación del tiempo

de exposición. Mientras los videojuegos educativos y gamificados muestran beneficios consistentes en el ámbito académico y metacognitivo, el uso problemático se asocia con consecuencias negativas en atención, autorregulación y rendimiento escolar. Estas diferencias subrayan la necesidad de integrar los videojuegos de manera pedagógica y regulada, así como de continuar investigando sus efectos para optimizar su potencial como herramienta educativa y prevenir riesgos asociados a la adicción.

Remote Traumatic Brain Injury and Current PTSD Severity in Older Vietnam War Veterans

Nicole Miranda-Acevedo, Edanilka Medina-Sustache & Héctor M. Gómez-Martínez

Universidad Carlos Albizu

Objectives: To examine the association between the timing of traumatic brain injury (TBI) and current posttraumatic stress disorder (PTSD) symptom severity in older Vietnam War veterans using the ADNIDOD dataset. **Method:** A quantitative, cross-sectional, correlational study was conducted using secondary data analysis. The sample included 428 older veterans with a history of TBI. Spearman's rho correlations with listwise deletion were performed using Year of TBI, age at TBI, PTSD severity measured by the Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS), depressive symptoms measured by the Geriatric Depression Scale (GDS), and global cognitive performance measured by the Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Demographic data were available for a subsample of 327 participants, with a mean age of 69.59 years (SD = 6.02; range

= 53.84–85.16); 99.4% were male. **Results:** A small but significant negative association was found between Year of TBI and CAPS Total scores ($r_s = -.103$, $p = .033$), indicating that more remote TBIs were associated with greater current PTSD symptom severity. No significant associations were found between PTSD severity and MoCA performance or depressive symptoms. Year of TBI was strongly associated with age at TBI ($r_s = .800$, $p < .001$). **Conclusions:** Findings suggest that psychological sequelae of TBI may remain clinically relevant decades after the original injury in older Vietnam War veterans. The lack of association with MoCA performance may indicate that global cognitive screening measures are not sensitive enough to detect subtle trauma-related cognitive vulnerability in this population.

Asociación del tiempo del uso de pantallas en el rendimiento de procesos atencionales, vigilancia y control inhibitorio en contexto escolar primario en México

Ochoa Gutierrez Karla Stephania, Blasio Duarte Miguel Angel, Aguirre Rivera Fátima, Guerrero Enriquez Raquel, Aguilar Gil Renata, Nuñez Goya, Tania Alejandra

AMN Asociación Mexicana de Neuropsicología

El uso de pantallas en la infancia ha aumentado de forma acelerada, iniciando incluso antes del primer año de vida. El objetivo del presente estudio fue analizar la relación entre el tiempo de uso de pantallas con el funcionamiento atencional (atención sostenida y vigilancia) y el control inhibitorio en niños de entre 6 y 9 años. La muestra se conformó por 35 niños escolarizados. El proceso atencional fue evaluado mediante la prueba estandarizada Aula Nesplora y el cuestionario Screen Time Questionnaire (STQ) que evalúa la exposición del tiempo de uso de pantallas. Del 51.2% de la población que mostró alteraciones en los procesos de atención sostenida, el 40% presentó riesgo moderado de uso de pantallas. En cuanto a

la vigilancia, el 50% de los alumnos con rendimiento bajo, presentan riesgo moderado; además, se observó que en el control inhibitorio, el 63.6% de los participantes con desempeño bajo mantienen niveles moderados de exposición digital; por tanto, puede existir una asociación entre alteraciones de autorregulación en tareas prolongadas y monótonas con el tiempo de consumo digital. La exposición prolongada en tiempo de pantallas podría contribuir a un menor desempeño en el control inhibitorio y la vigilancia, tomando en cuenta que existen otros factores que influyen en el desarrollo de dichas habilidades, por lo que se destaca la importancia de promover hábitos digitales saludables y estrategias preventivas.

Evaluación neuropsicológica cinco años posterior a tratamiento oncológico multimodal en superviviente pediátrico de tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial: estudio de caso único

Perla Karen Bruno Vázquez, Ivonne Aparicio Ochoa

NEUROCLARITY

Los avances terapéuticos en neurooncología pediátrica han incrementado la supervivencia de niños con tumores del sistema nervioso central; sin embargo, la identificación de cambios cognitivos a largo plazo constituye actualmente un desafío clínico relevante. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar el perfil neuropsicológico de un adolescente evaluado cinco años después de la finalización de tratamiento oncológico multimodal por tumor neuroectodérmico primitivo supratentorial. Se desarrolló un estudio de caso único con diseño observacional descriptivo transversal, mediante una evaluación neuropsicológica integral que incluyó medidas estandarizadas de funcionamiento intelectual, atención, memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, habilidades académicas y regulación emocional, complementadas con información clínica y reportes de familia y escuela. El perfil obtenido evidenció una organización cognitiva heterogénea, con preservación relativa de habilidades verbales, control inhibitorio y ajuste

emocional, en contraste con debilidades significativas en velocidad de procesamiento, razonamiento fluido, memoria de trabajo y atención sostenida, con mayor compromiso del procesamiento visual. Asimismo, se identificaron dificultades relevantes en habilidades grafomotoras y en aprendizajes académicos instrumentales, particularmente en lectura, escritura y cálculo. El patrón observado resulta consistente con ineficiencia en redes fronto-subcorticales y sistemas de integración visomotora implicados en la automatización cognitiva. Ante la ausencia de evaluación neuropsicológica basal, la interpretación se sustentó en análisis intraindividual y comparación normativa por edad, evitando inferencias causales. Los hallazgos subrayan el valor de la evaluación neuropsicológica tardía como herramienta para la detección de vulnerabilidades funcionales y la planificación de apoyos clínicos y educativos, destacando la necesidad de seguimiento longitudinal interdisciplinario en supervivientes pediátricos de tumores cerebrales.

Teoría de la Mente y CI en Niños con TEA Grado 1

Raquel Guerrero Enríquez, Frida Sofía Mena Aguilar, Miguel Angel Blasio Duarte y Sandra Paulina Juárez Juárez

Universidad Panamericana, Ciudad de México

El estudio analiza la relación entre la Teoría de la Mente (ToM) y el Coeficiente Intelectual (CI) en niños de 4 a 5 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) grado 1. El TEA se caracteriza por dificultades en la comunicación social y patrones de comportamiento repetitivos, lo que afecta la comprensión de emociones, intenciones y pensamientos de otros. La ToM, como capacidad de atribuir estados mentales, es clave en la cognición social, mientras que el CI evalúa el funcionamiento intelectual general, mostrando gran variabilidad en esta población. El objetivo fue determinar si existe una relación entre ambas variables. Se evaluó a 24 niños utilizando la escala WPPSI-III para CI y la prueba de Falsa Creencia para ToM. Debido a la distribución de los datos, se empleó la correlación de Spearman. Los

resultados evidenciaron una correlación positiva moderada entre el CI total y la ToM ($r = .542; p = .011$). Destacó el Índice de Comprensión Verbal (ICV) como el predictor más fuerte ($r = .631; p = .002$), especialmente la subprueba de Pistas. Esto sugiere que las dificultades en la comunicación social no se deben únicamente a un vocabulario limitado, sino a problemas en la generación de inferencias. Se concluye que un mayor CI se asocia con mejor desempeño en ToM. Además, el lenguaje, particularmente las habilidades inferenciales, puede actuar como mecanismo compensatorio que atenúa los síntomas del TEA. Estos hallazgos resaltan la importancia de diseñar intervenciones centradas en el desarrollo de habilidades verbales inferenciales para mejorar la adaptación social en esta población.

Evaluación neuropsicológica de un paciente con síndrome de Williams

Samuel De Nova Castillo, Mario Arturo Rodríguez Camacho

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Posgrado en Psicología

El síndrome de Williams (SW) es un trastorno genético multisistémico causado por una microdeleción en la región q11.23 del cromosoma 7, asociado con un perfil neurocognitivo que incluye discapacidad intelectual, alteraciones visoespaciales, dificultades en funciones ejecutivas, habilidades académicas e hipersociabilidad, así como de ciertas fortalezas en el lenguaje expresivo. Aunque ha sido mayormente documentado en la literatura internacional, la evidencia sobre su caracterización neuropsicológica en población latinoamericana aún es limitada, por lo que es relevante el estudio clínico del síndrome en este contexto. El objetivo del estudio fue describir el perfil neuropsicológico de un paciente con síndrome de Williams. Se realizó un estudio de caso en un paciente masculino de 12 años. Los resultados

evidenciaron discapacidad intelectual (CI=42, WISC-IV), con alteraciones en procesos atencionales (pc=10-20, BANETA), funciones ejecutivas (IGE=76, BRIEF-2) y habilidades visoespaciales (PVG=59, DTVP-3), así como en el rendimiento académico (ICM=62, TEMA-3), destacando ausencia de habilidades lectoras y dificultades para la copia de material escrito (nivel 1 de lectoescritura, TALE), habilidades adaptativas (CAG=57, ABAS-II), ausencia de alteraciones emocionales (EMO=39, SENA) y un desempeño adecuado en segmentación de palabras (pc=40, BANETA). Los hallazgos son consistentes con el perfil neurocognitivo reportado en la literatura internacional para el SW y destacan la importancia de la evaluación neuropsicológica para el diseño de programas de intervención individualizados.

Efecto de una intervención neuropsicológica grupal centrada en el control inhibitorio sobre la gravedad de los síntomas y la conducta ejecutiva en niños con TDAH

David Antonio Pineda Salazar, Yaira Zuleine Arias Ramírez, Alejandra Arboleda Ramírez

Universidad San Buenaventura de Medellín, Hospital Neurológico de Colombia

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por inatención, hiperactividad e impulsividad, frecuentemente asociado a alteraciones en control inhibitorio. Objetivo: Evaluar el efecto de una intervención neuropsicológica grupal centrada en control inhibitorio sobre la gravedad de los síntomas y la conducta ejecutiva en niños con TDAH. Método: Estudio cuasiexperimental, con diseño pre-post en un solo grupo. Participaron 21 niños entre los 9 y 12 años con diagnóstico de TDAH. La intervención consistió en 12 sesiones grupales orientadas al entrenamiento del control inhibitorio en sus componentes motor, cognitivo, conductual y emocional, junto

con tres sesiones psicoeducativas dirigidas a padres. Se utilizaron el ADHD-RS-5 y el BRIEF-2 para evaluar cambios en síntomas y funciones ejecutivas. Resultados preliminares: De forma preliminar, los reportes de padres indican una disminución de la impulsividad, mejoría en el rendimiento académico y mayor tiempo de permanencia en la tarea. Asimismo, los niños refieren percibir un mayor control de sus impulsos. Estos hallazgos sugieren posibles efectos positivos de la intervención sobre la regulación conductual. Conclusiones preliminares: Los resultados preliminares sugieren que las intervenciones grupales podrían ser una estrategia prometedora para el abordaje del TDAH.

Evaluación y Rehabilitación Neuropsicológica En Una Enfermedad Rara: Síndrome De Prader-Willi

Valentina Ospina Castro, Carolina Cárdenas Vargas.

Grupo de Investigación GIDEAL

Objetivo: Describir el perfil neuropsicológico y los cambios cognoscitivos mediante análisis comparativo pre y posintervención, en una paciente adulta diagnosticada con Síndrome de Prader Willi. Métodos: Enfoque cualitativo. Análisis de caso. Resultados: El Síndrome de Prader-Willi, es considerada enfermedad rara, se describe como un trastorno complejo del neurodesarrollo. Con una incidencia de 1 de cada 15.000 nacidos vivos. La causa se atribuye a la carencia de un gen en una parte del cromosoma 15. Se caracteriza por: enfermedades metabólicas, músculoesqueléticas, respiratorias y cardíacas, hipersomnia diurna, alteración en la percepción del dolor y la temperatura, disfunción hipotalámica y en diencefalo, déficit intelectual, hiperfagia y un fenotipo neuroconductual característico. Los resultados de evaluación inicial evidenciaron alteración severa en el funcionamiento de la

memoria, atención y funciones ejecutivas, déficit intelectual leve a moderado y trastorno de déficit de atención tipo inatento. El programa se enfocó en fortalecer el funcionamiento ejecutivo a través del desarrollo de actividades que optimizaron el control atencional voluntario, la inhibición, flexibilidad cognitiva, autorregulación, memoria operativa, planificación y verificación propia. La evaluación neuropsicológica pos intervención, evidenció cambios favorables en flexibilidad cognitiva, velocidad de procesamiento, atención visual y evocación de información presentada en la modalidad visual. Conclusiones: El conocimiento de esta enfermedad rara, la evaluación y rehabilitación neuropsicológica y el abordaje multidisciplinario, contribuye al funcionamiento cognitivo global, a la calidad de vida de los pacientes adultos con esta enfermedad, inclusión, participación y al pronóstico funcional.

Comparación de perfil Neuropsicológico en adultos mayores mestizos-mexicanos portadores y no portadores de Apolipoproteína E4 (APOE-4)

Vanessa Gabriela Barajas Bollas, Olga Yaneth Rodriguez Agudelo

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía

Introducción: El alelo APOE-4 es el principal factor genético de riesgo para la enfermedad de Alzheimer (EA) esporádica, ya que favorece la acumulación de β -amiloide y la neuroinflamación lo que contribuye al deterioro cognitivo. En la población mexicana, su presencia se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar trastornos neurodegenerativos en comparación con aquellos que no lo portan. **Objetivo:** comparar el perfil neuropsicológico de portadores de APOE-4 con aquellos sin este alelo, a través de una evaluación neuropsicológica completa. **Método:** Estudio cuasiexperimental, transversal y correlacional-comparativo. Se evaluaron los dominios de atención, memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. Se realizó genotipado para determinar estatus APOE- ϵ 4. La muestra estuvo conformada por 40 participantes (20 portadores y 20 no portadores; 28 mujeres y 12 hombres). Se calcularon puntajes Z por prueba. La normalidad se evaluó mediante Shapiro-Wilk por grupo. Se

aplicó t de Student en variables con distribución normal y U de Mann-Whitney en aquellas sin normalidad. Se estableció $\alpha = .05$. **Resultados:** No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en memoria (Rey evocación, $p=.142$; Hopkins espontánea, $p=.648$), atención (TMT-A, $p=.767$; TBA, $p=.260$) ni funciones ejecutivas globales. Únicamente la fluidez fonológica con la letra A mostró diferencia significativa ($p=.020$), con menor rendimiento en portadores; sin embargo, esta diferencia no se replicó en otras letras ni en fluidez semántica. **Discusión:** Los hallazgos sugieren ausencia de un perfil neuropsicológico diferencial amplio asociado al estatus APOE- ϵ 4 en adultos cognitivamente conservados. La diferencia aislada en fluidez fonológica debe interpretarse con cautela debido al número de comparaciones realizadas. Estos resultados son congruentes con estudios que señalan que el impacto cognitivo del APOE- ϵ 4 en fases preclínicas puede ser sutil.

Síndrome de Marfan: Comparación de perfiles neuropsicológicos en dos pacientes pediátricos.

Martínez-Pérez Vania Montserrat¹; Hernández-González Romina¹

¹Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM

Introducción: El Síndrome de Marfan (SM) es un padecimiento congénito, caracterizado por alteraciones esqueléticas como talla mayor al promedio, extremidades largas, pectus excavatum o carinatum, escoliosis, problemas cardíacos, oculares, alteraciones psicológicas y neuropsicológicas. Con una incidencia de 1:5000 y una prevalencia del 50% de heredabilidad. **Objetivo:** Describir y comparar el perfil neuropsicológico de dos pacientes pediátricos con SM. **Método:** Diseño transversal descriptivo. **Participantes:** 2 pacientes hombres de 13 (Caso 1) y 16 años (Caso 2) con diagnóstico confirmatorio de SM por el departamento de genética del Hospital de Pediatría "Dr. Silvestre Frenk Freund", Centro Médico Nacional S.XXI. **Instrumentos:** Se aplicaron las pruebas

WISC-IV/WAIS IV, NEUROPSI atención y Memoria, ENI-2, BRIEF 2 y la Escala de evaluación TDAH-5 para la evaluación cognitiva; las pruebas ABAS II, SENA, y PAI-A para lo adaptativo, conductual, emocional y para evaluar sintomatología psiquiátrica. **Resultados:** Ambos pacientes contaron con diagnóstico confirmado. El caso 1 obtuvo un perfil cognitivo con puntuaciones severas y un diagnóstico de discapacidad intelectual. El caso 2 obtuvo un perfil dentro de la norma con dificultades leves de atención sostenida y de memoria a corto plazo. **Conclusiones:** Los perfiles neuropsicológicos de los pacientes son muy diversos tomando en cuenta que ambos tienen las mismas características genéticas. Lo que muestra la gran heterogeneidad del padecimiento.

Las emociones en la intimidad digital: sexting y control de impulsos en jóvenes universitarios E

Yanin Santoya-Montes, Ana Merchán Clavelino, María Serrano Diaz

Universidad de Cadiz

El sexting en jóvenes se ha vuelto una conducta frecuente en entornos digitales, vinculada tanto a situaciones de riesgo como a formas de exploración socioafectiva. Gran parte de la investigación se ha enfocado en variables sociales y en procesos cognitivos asociados a la toma de decisiones, pero este estudio lo aborda desde la neuropsicología, centrando la atención en la autorregulación emocional y, específicamente, en el control de impulsos como una capacidad clave en este tipo de comportamientos. Se trabajó con un diseño transversal-correlacional en 874 estudiantes universitarios entre 16 y 22 años, mediante instrumentos de autorreporte sobre sexting y autorregulación. Los resultados muestran que el sexting está presente en la vida digital de los participantes, con frecuencias entre 47,1% y 58,9%. En el sexting gráfico, los

porcentajes son mayores en contenidos menos explícitos y privados (47,1% sugerente y 51,4% en ropa interior vía móvil), pero bajan en desnudos (40,7%) y aún más en redes sociales (29,9% y 25,5%). En el sexting verbal aparecen las cifras más altas, con 58,9% en mensajes sugerentes y 57,1% en proposiciones por móvil, manteniéndose también en redes sociales (43,1% y 37,3%). Además, el control de impulsos se asocia de forma significativa con ambas formas de sexting ($p = 0,000$), con coeficientes de correlación moderados. Estos hallazgos aportan al campo de la neuropsicología al mostrar que las conductas digitales no solo dependen del contexto social, sino también del funcionamiento autorregulatorio, abriendo una línea clara para comprender y abordar el sexting desde los procesos de control conductual.

Síndrome Metabólico y desempeño neuropsicológico en adultos activos laboralmente en la ciudad de Cúcuta

Edgar Díaz-Camargo;Yudy Chaparro-Suarez;María-Fernanda Sánchez;Liseth-Vanessa Álvarez;Carmen-Alexandra Fierro

Universidad Simón Bolívar, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro de Investigación en Estudios Fronterizos, Cúcuta, Colombia.

El envejecimiento es un proceso irreversible y natural en el ciclo de vida, donde se encuentran ganancias y pérdidas evolutivas en el proceso cognitivo. De igual forma, el Síndrome Metabólico (SM) emerge no solo como un riesgo cardiovascular, sino como un factor determinante en el declive de procesos psicológicos superiores, cuya detección oportuna en población laboralmente activa es crucial para preservar la funcionalidad y calidad de vida. Se tiene como objetivo explicar la influencia de la presencia de factores del SM, en sus diversas combinaciones, sobre el rendimiento cognitivo de adultos activos laboralmente en la ciudad de Cúcuta. Se realiza estudio cuantitativo con una muestra de 115 adultos (30-50 años;57.39% mujeres). Se administró un protocolo neuropsicológico. El análisis estadístico empleó regresión lineal múltiple para

ajustar variables de confusión como edad, escolaridad y horas de sueño, permitiendo identificar el impacto específico de los componentes del SM. La prevalencia de SM fue del 53.04%, predominando la obesidad abdominal (95.65% de los casos). Los modelos de regresión revelaron que la circunferencia abdominal predice significativamente un menor desempeño global y una menor velocidad de procesamiento. Se observaron déficits en memoria de trabajo, funciones ejecutivas y atención en el grupo con SM comparado con el grupo sano. El SM impacta negativamente la reserva cognitiva en la mediana edad. La obesidad abdominal se posiciona como el predictor más robusto de alteración neuropsicológica, subrayando la necesidad de programas de intervención temprana que integren salud metabólica y neuropsicológica en entornos laborales.

“Determinación de las concentraciones de serotonina y su asociación con trastornos de la conducta alimentaria y sintomatología ansiosa, depresiva y/o estresante en población adulta en Jalisco, México”

Fatima Covarrubias-Ulloa, Dra Monserrat Macías-Carballo, Mtra. María Fernanda Ortega-Morfin.

Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara, Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, C.P. 47620, Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México.

Introducción: Los Trastornos de la Conducta Alimentaria representan un problema creciente de salud mental en Jalisco, con alta prevalencia, mortalidad y aumento tras la pandemia por COVID-19. Su origen es multifactorial, involucrando factores psicológicos, sociales y neurobiológicos, destacando el papel de la serotonina en la regulación del apetito, estado de ánimo y conducta. **Objetivo:** Determinar la asociación entre las concentraciones de serotonina y la presencia de TCA, así como su relación con sintomatología ansiosa, depresiva y de estrés en población adulta de Jalisco. **Método:** Estudio cuantitativo, transversal y correlacional con 77 participantes. Se aplicó el Test de Actitudes Alimentarias (EAT-26) para identificar riesgo de TCA, la Escala de

Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS-21) y análisis sanguíneo para medir concentraciones séricas de serotonina. **Resultados:** El 41.6% presentó riesgo de TCA. Más del 60% reportó ansiedad severa o extremadamente severa y 30% estrés elevado. En depresión, el 72.7% mostró niveles moderados y el 22.1% extremadamente severos. El 10.4% presentó niveles bajos de serotonina. No se encontraron asociaciones estadísticamente significativas; sin embargo, la razón de momios (OR) sugiere una tendencia donde el estrés elevado y serotonina baja podrían constituir factores de riesgo. **Conclusión:** No se identificaron asociaciones significativas, la elevada sintomatología emocional y el riesgo de TCA evidencian un panorama clínico preocupante.

Efectos del entrenamiento cognitivo compensatorio en pacientes mexicanos con esquizofrenia: estudio piloto.

Jesús Antonio Luna Padilla, Cristina Alejandra Mondragón Maya, Yvonne Flores Medina, Alejandra Ruiz Contreras.

La intervención del Entrenamiento Cognitivo Compensatorio (ECC), el ECC consiste en 12 sesiones semanales de modalidad grupal enfocándose en dominios de atención, memoria prospectiva, aprendizaje verbal y visual, flexibilidad cognitiva, planeación y resolución de problemas, mostrando evidencia de mejorías significativas en dichos dominios en pacientes con condiciones psicóticas. El objetivo es analizar los efectos del ECC en la cognición de un grupo piloto de pacientes con diagnóstico dentro del espectro de la esquizofrenia. La muestra fueron 22 pacientes con diagnósticos dentro del espectro de la esquizofrenia. La medición de la cognición se realizó con la prueba MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB). Se analizaron los resultados de manera grupal con pruebas t de Student para grupos dependientes y de manera individual con el

índice de cambio confiable (ICC). En subpruebas e índices aumentó las medias del grupo, sin embargo, sólo se encontró diferencias significativas en la subprueba LNS ($t = -2.34$, $p = .029$, $d = -0.50$), índice de velocidad de procesamiento ($t = -2.76$, $p = .01$, $d = -0.58$) e índice memoria de trabajo ($t = -2.23$, $p = .03$, $d = -0.47$). Los efectos del ECC fueron en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento, lo cual es consistente con los antecedentes de la intervención, además las características plantean la posibilidad de que el ECC sea viable para su aplicación en la población mexicana y en una población con diagnóstico del espectro de la esquizofrenia en consulta externa.

Palabras Claves: espectro de esquizofrenia, ECC, remediación cognitiva, velocidad de procesamiento y memoria de trabajo.

Perfil neurocognitivo de una menor de 11 años con diagnóstico de Arnold–Chiari tipo II y Mielomeningocele: estudio de caso

Manuela Berrocal-García y Lisseth Vanessa Gutierrez-Britto

Universidad de San Buenaventura, Bogotá D.C

El presente estudio de caso describe el perfil neurocognitivo de una niña de 11 años con malformación de Arnold–Chiari tipo II y mielomeningocele, condiciones que impactan de manera significativa en su neurodesarrollo. A través de una evaluación neuropsicológica integral, que incluyó habilidades como memoria, lenguaje, funciones ejecutivas y habilidades visoespaciales y el nivel intelectual. Se identificó un funcionamiento heterogéneo: la paciente presenta fortalezas en comprensión verbal y memoria semántica, junto con fallas en velocidad de procesamiento, planeación, flexibilidad cognitiva y desempeño

visoconstructivo. En el aspecto emocional se evidenció una sensibilidad afectiva asociada tanto a su condición médica como a los desafíos adaptativos derivados de ella y a posible síndrome cerebeloso. Los resultados se discuten a la luz de la literatura sobre malformaciones del tubo neural, resaltando la necesidad de valoraciones tempranas, e intervenciones integrales que aborden simultáneamente los componentes cognitivos y emocionales para favorecer su bienestar y desarrollo funcional.

Palabras claves: Neuropsicología infantil, Arnold–Chiari tipo II, Mielomeningocele, Funciones ejecutivas.

Caracterización Neuropsicológica y Conductual de un Paciente con Macroadenoma Hipofisario con Múltiples Resecciones Quirúrgicas y Radioterapia

Lizeth Tatiana amargo, Alejandra Novoa, Heidi Rojas, & Zulay Montenegro

Subred del Norte

Este estudio presenta el recorrido clínico y neuropsicológico de un hombre de 66 años con un macroadenoma hipofisario tipo gonadotropinoma, cuyo curso ha sido largo y complejo, marcado por cirugías transcraneales y transesfenoidales, además de radioterapia. A través de una evaluación detallada fue posible observar un perfil cognitivo mixto: por un lado, se conservan habilidades como el lenguaje, la comprensión verbal, las praxias y la memoria auditiva; por el otro, emergen dificultades más visibles en atención alternante, velocidad de procesamiento, memoria visual y, de manera más notoria, en funciones ejecutivas vinculadas con la flexibilidad cognitiva, planificación y supervisión de la acción. La historia del caso permite comprender cómo la enfermedad y sus tratamientos, especialmente la manipulación

quirúrgica en regiones hipotalámicas y la radiación acumulada, pueden influir en el funcionamiento cognitivo y comportamental. Si bien el participante mantiene capacidades importantes para la comunicación y el aprendizaje verbal, el enlentecimiento cognitivo y los errores en tareas que exigen cambio de criterio señalan la necesidad de seguimiento y acompañamiento terapéutico. Documentar este proceso no solo aporta a la literatura clínica en tumores hipofisarios, sino que también resalta el valor de la evaluación neuropsicológica para guiar intervenciones y favorecer la calidad de vida en casos donde la recuperación ocurre a un ritmo fluctuante. Palabras claves: Macroadenoma hipofisario, gonadotropinoma, cirugía transesfenoidal, radioterapia hipofisaria, evaluación neuropsicológica, funciones ejecutivas.

Evaluación biopsicosocial en neuropsicología: estudio piloto sobre la aplicabilidad del IFBr-M en la evaluación de trastornos del neurodesarrollo

Aline Carolina Bassoli Barbosa, Vera Lúcia Messias Fialho Capellini, Ivanda Souza Silva Tudesco

UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

El presente trabajo presenta un estudio piloto que investiga la aplicabilidad del Índice Brasileño de Funcionamiento Modificado (IFBr-M) en el contexto de la evaluación neuropsicológica de individuos con Trastornos del Neurodesarrollo (NDD). Se basa en el paradigma biopsicosocial establecido por la Ley Brasileña para la Inclusión de Personas con Discapacidad, que propone la comprensión de la discapacidad a partir de la interacción entre condiciones de salud, factores personales y contextuales. A pesar de este avance normativo, se observa que la práctica neuropsicológica aún permanece predominantemente centrada en modelos clínico-clasificatorios, con menor integración de aspectos funcionales y ambientales. Se trata de una investigación aplicada, de carácter cualitativo y cuantitativo, con un diseño piloto. Participaron seis personas, con edades y perfiles de desarrollo heterogéneos,

remitidos por servicios educativos y una institución filantrópica. El procedimiento incluyó evaluación psicológica con 3 individuos y evaluación neuropsicológica con otros 3 individuos. Al final se aplicó el IFBr-M con el tutor legal, permitiendo el análisis comparativo entre datos funcionales y hallazgos cognitivos y conductuales. Los resultados preliminares indican que el IFBr-M contribuye a una comprensión más integral de la funcionalidad, al integrar información clínica, psicológica y contextual, además de favorecer la identificación de barreras ambientales y demandas específicas de apoyo. También se observó una mayor claridad en la traducción de los resultados de la evaluación en términos de impacto funcional. Se concluye que el IFBr-M tiene potencial aplicabilidad en la práctica psicológica y neuropsicológica, alineándose con el modelo biopsicosocial.

Cambios funcionales, afectivos, sociales y cognitivos en adultos mayores institucionalizados versus no institucionalizados: una revisión narrativa

Amalia Salazar Villegas

Estudiante Programa de Psicología. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.
Universidad CES.

Objetivo: Analizar la correlación entre cambios en las dimensiones funcional, afectiva, social y cognitiva en adultos mayores institucionalizados en comparación con quienes residen en su hogar. **Metodología:** Se realizó una revisión narrativa de literatura científica en bases de datos como Redalyc, PubMed y SciELO, entre otras. Se incluyeron artículos que cumplieran con los criterios de la revisión documental y se excluyeron aquellos relacionados con los efectos de la pandemia en esta población. **Resultados:** En la dimensión funcional, los adultos mayores que viven solos presentaron mayor riesgo de malnutrición, mientras que los institucionalizados mostraron menor dificultad para realizar actividades de la vida diaria. En la dimensión afectiva, la institucionalización se asoció con mayor riesgo de depresión, vinculada

a la pérdida de autonomía y las barreras para el contacto con redes de apoyo. En la dimensión social, se evidenció mayor sentimiento de soledad en adultos mayores institucionalizados, con una relación directa entre soledad y depresión. En la dimensión cognitiva, este grupo presentó mayor riesgo de deterioro, influenciado por el estado de salud previo al ingreso, la pérdida de autonomía y el aislamiento social. **Conclusiones:** La institucionalización en adultos mayores se asocia con mayor riesgo de depresión, deterioro cognitivo y afectación social, en relación directa con la pérdida de autonomía, el aislamiento y el estado de salud al ingreso. Estos hallazgos subrayan la necesidad de diseñar intervenciones que fortalezcan la autonomía, el vínculo familiar y la estimulación cognitiva en entornos institucionales.

Características de la denominación en pacientes con antecedentes de ACV isquémico y hemorrágico atendidos en Hospital Neurológico de Colombia

Venegas Álvarez, Luis Yoanny, Arias Ramirez, Yaira Z., Arboleda Ramírez, Alejandra

Semillero de Investigación Neuro-net.
Universidad San Buenaventura, Medellín.
Hospital Neurológico de Colombia.

Introducción: el lenguaje es un proceso de gran complejidad, siendo la denominación uno de los dominios más importantes en la comunicación. Una de las principales causas de alteración son los ataques cerebrovasculares (ACV) produciendo diferentes grados de discapacidad y alteraciones en la funcionalidad. **Objetivo:** determinar las alteraciones en la denominación en pacientes adultos con antecedentes de ACV isquémico o hemorrágico atendidos en el Hospital Neurológico de Colombia. **Metodología:** Estudio transversal analítico de fuentes secundarias (historias clínicas y evaluaciones neuropsicológicas) de pacientes con ataque cerebrovascular isquémico (ACVI) y hemorrágico (ACVH) atendidos entre los años 2011 y 2021 en el Hospital Neurológico de Colombia. **Resultados:** Se analizaron los datos de 128 pacientes, la mediana en la edad fue de 55 años;el 72,2 %

con ACVI y 27,3% con ACVH;el 53,9% fueron hombres y el hemisferio más afectado fue el izquierdo en un 55,5%. Se observaron puntuaciones más bajas en las pruebas de lenguaje en pacientes con ACVH en comparación con el ACVI, sin diferencias estadísticas. Se encontraron significativamente puntuaciones bajas en lesiones del hemisferio izquierdo en el Test de denominación ($p < 0,001$), Token test ($p = 0,014$), fluidez semántica ($p=0,004$) y fluidez fonológica ($p=0,007$). **Conclusiones:** Las alteraciones de la denominación son significativamente más frecuentes en lesiones del hemisferio izquierdo y aunque no se encontraron diferencias significativas según el tipo de ACV, se presenta un impacto discreto mayor en los pacientes con ACVH. Los ACV de la arteria cerebral media (ACM) tuvieron puntuaciones más bajas en las pruebas de lenguaje.

Características narrativas de niños con dislexia

Carlos Vicente González García

Secretaría de Educación Jalisco, México

El trastorno específico del aprendizaje de la lectura TEAdL es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en el procesamiento fonológico, con alteraciones en codificación, fluidez o en comprensión. La narración constituye una habilidad lingüística organizada a partir de estructuras secuenciales con inicio, desarrollo, clímax y coda. Se considera que estas estructuras se consolidan alrededor de los seis años y se enriquecen progresivamente a lo largo del desarrollo escolar. A pesar de la relevancia del lenguaje narrativo en los contextos educativos y comunicativos, existe escasa evidencia sobre la forma en que los niños con TEAdL construyen narraciones. La presente investigación busca contribuir a esta área de conocimiento mediante el análisis de narraciones producidas por niños con TEAdL, tanto en narraciones orales personales como en narraciones mediadas por un recurso audiovisual. **Objetivo:**

identificar patrones estructurales, temáticos y lingüísticos que permitan una comprensión más amplia de las habilidades comunicativas de los niños con TEAdL. **Población:** Estudio cualitativo basado en el análisis de 14 narraciones orales personales y 9 narraciones mediadas por video, producidas por niños de 4° diagnosticados con TEAdL. **Resultados** las narraciones personales se caracterizan por escasa descripción de eventos y personajes. En las narraciones mediadas por video hay dificultades en: inferencias sobre acciones, intenciones y emociones de los personajes;secuencia de los acontecimientos, cohesión y fluidez discursiva, uso restringido del vocabulario y deficiencias en recursos sintácticos y semánticos. Estos hallazgos sugieren que el TEAdL impacta no solo en la lectura, sino en competencias lingüísticas narrativas, con implicaciones relevantes para la intervención educativa y neuropsicológica.

Perfil neuropsicológico pre y post quirúrgico en paciente con heterotopia como causa de epilepsia refractaria: reporte de caso

Carolina Traslaviña Torres, Yorberth Lenin Salazar Márquez

Introducción: La heterotopia cerebral es un grupo de malformaciones raras con un fenotipo heterogéneo, que va desde asintomático hasta un cuadro clínico grave, epilepsia farmacorresistente, retraso grave del desarrollo y suponen el 10% de las convulsiones médicamente intratables. **Objetivo:** describir el perfil neuropsicológico pre y post en una paciente con heterotopia como causa de epilepsia refractaria en la fundación centro colombiano de epilepsia y enfermedades neurológicas Jaime Fandiño Franky, en Cartagena, Colombia. **Pacientes y métodos:** En el presente estudio se investigó un caso de una paciente femenina de 18 años de edad, con heterotopia cerebral mediante examen clínico, estudio electroencefalográficos, imágenes diagnósticas, y pruebas neuropsicológicas. En este caso la paciente presentaba crisis epilépticas de difícil control farmacológico, así mismo, dificultades en el aprendizaje y retraso del neurodesarrollo. **Resultados:** la paciente presentó un coeficiente intelectual de 73 límite lo que corrobora su bajo desempeño a nivel intelectual. En

cuanto al perfil neuropsicológico pre quirúrgico evidenciaba dificultades moderadas en dominios de atención alternante, dificultades en la memoria verbal, y tareas de control mental. No obstante, se encontró que posterior a la intervención quirúrgica la paciente presentó mejoría en dominios de memoria verbal y atención alternante a nivel cognitivo, y disminución de la frecuencia ictal, es decir el perfil neuropsicológico post quirúrgico evidencia una mejoría significativa a nivel cognitivo en la escala cognitiva Montreal MoCA, y un rendimiento en la curva de memoria verbal del 50%. Mejorando significativamente su calidad de vida y la de su familia. **Conclusiones:** la heterotopia es un trastorno neuronal que afecta el funcionamiento a nivel cognitivo y del neurodesarrollo, sin embargo, la cirugía de epilepsia fármaco resistente constituye en sí una técnica de neuro rehabilitación, que otorga una respuesta eficaz a síndromes epilépticos remediabiles, en la cual la preservación de las funciones cognitivas y la disminución de las crisis deben ser el objetivo.

Descubrimientos recientes en redes neuronales desde la neurociencia del desarrollo: Evidencia que soporta el modelo de RDS (relational developmental systems) en Desarrollo

Claudia Ovalle

Universidad de Antioquia

Durante el período 2020–2025, la neurociencia del desarrollo ha producido avances significativos en la comprensión de cómo se forman y reorganizan las redes neuronales a lo largo del desarrollo humano. Un hallazgo central es que la maduración cerebral ocurre mediante procesos dinámicos de plasticidad, poda sináptica y reorganización de circuitos, más que por un simple aumento progresivo de conexiones neuronales. Estudios recientes han demostrado que las células microgliales desempeñan un papel clave en la poda sináptica, eliminando conexiones débiles para fortalecer circuitos funcionales durante la infancia y la adolescencia, proceso fundamental para la maduración de las redes neuronales y la eficiencia cognitiva (Nandi et al., 2025). Otra línea de investigación relevante ha identificado que la plasticidad cerebral disminuye

de manera secuencial en diferentes regiones del cerebro. Las áreas sensoriomotoras (visión, audición y movimiento) maduran primero, mientras que las regiones asociativas implicadas en funciones ejecutivas, razonamiento social y toma de decisiones permanecen plásticas durante más tiempo, especialmente en la adolescencia (Satterthwaite et al., 2023). Además, estudios de conectividad funcional muestran que las redes cerebrales evolucionan desde configuraciones locales y modulares en la infancia hacia sistemas más integrados y especializados durante la adolescencia y la adultez temprana. Este proceso implica cambios en redes como el default mode network y los sistemas atencionales, lo que permite una mayor eficiencia en el control cognitivo y la regulación emocional (Ahmadi et al., 2025). Investigaciones recientes también han

revelado cómo emergen gradualmente las representaciones del lenguaje en el cerebro. Los niños pequeños muestran actividad neuronal relacionada con rasgos fonéticos, mientras que las representaciones semánticas y sintácticas más complejas aparecen posteriormente en regiones corticales asociativas (Evanson et al., 2025). En conjunto, estos descubrimientos muestran que el desarrollo humano implica una progresiva

especialización e integración de redes neuronales moldeadas por la interacción entre maduración biológica, experiencia y aprendizaje social. Esta evidencia aporta soporte empírico a la construcción de las posturas teóricas RDS que actualmente se están abordando en Desarrollo Humano, las cuales enfatizan las interacciones recíprocas entre ambiente, desarrollo, genética, actividad individual y contexto cultural.

Más Allá del Puntaje Global: Dimensión Temporal del Rendimiento Ejecutivo tras LI-rTMS en Adultos Mayores con DCLna

Claudia Patricia Pineda-Fernández

Universidad del Valle. pineda.claudia@correounivalle.edu.co

Introducción: El puntaje global de funciones ejecutivas en adultos mayores con deterioro cognitivo leve no amnésico (DCLna), puede ocultar cambios diferenciales en tareas específicas. La Estimulación Magnética Transcraneal Repetitiva Subumbral (LI-rTMS) se ha propuesto como estrategia de neuromodulación-no-invasiva en redes-prefrontales implicadas en control ejecutivo y compensación en el envejecimiento. Este estudio no incluyó pruebas puras-de-velocidad de procesamiento, la dimensión temporal del rendimiento ejecutivo (DTRE) se abordó como noción operativa/exploratoria, derivada de subpruebas del BANFE-3-con indicadores de tiempo y precisión-. **Objetivo:** Analizar la-dimensión DTRE tras aplicar protocolo LI-rTMS en adultos mayores con DCLna-mediante subpruebas sensibles a interferencia y planificación secuencial-. **Método:** Estudio cuasi experimental-longitudinal con medidas repetidas en 13 adultos mayores con DCLna, intervenidos con LI-rTMS sobre corteza

prefrontal dorsolateralizquierda-(CPFDL-F3) de lunes-viernes (durante 40 sesiones). El desempeño ejecutivo se evaluó pre-durante-post mediante BANFE-3. Se priorizó análisis temporal de Stroop B-Torre de Hanoi de 3 y 4 fichas mediante modelos lineales mixtos. **Resultados:** El puntaje total del BANFE-3 no mostró cambios significativos, $F(2,24)=1.72$, $p=.204$. En contraste, el tiempo de ejecución disminuyó en Stroop B al final de la intervención ($B=-54.62$, $p=.016$) y en Torre de Hanoi de 3 fichas en la medición intermedia y final ($B=-63.00$, $p=.040$; $B=-65.23$, $p=.034$). Torre de Hanoi de 4 fichas no mostró cambios significativos. **Conclusiones:** Se observaron cambios temporales selectivos en tareas de interferencia y planificación secuencial de menor complejidad. Estos hallazgos sugieren una modulación diferencial del rendimiento ejecutivo según la demanda de la tarea y se discuten desde los modelos HAROLD, PASA y CRUNCH como marcos-interpretativos de compensación en el envejecimiento.

Modelo neuropsicológico del impacto del trauma infantil en la cognición adulta: una aproximación transcultural

David Andrés Montoya Arenas

Universidad Pontificia Bolivariana- Universidad de San Buenaventura

Introducción: Las experiencias traumáticas en la infancia (ETT), incluyendo el maltrato y la violencia sociopolítica, representan un factor de riesgo significativo para el desarrollo neurocognitivo. Desde la neuropsicología y

la neurociencia, se ha evidenciado que estas experiencias afectan estructuras cerebrales y procesos como las funciones ejecutivas y la cognición social, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad sociocultural.

Método: Se realizó una integración de evidencia empírica proveniente de estudios cuantitativos, experimentales y revisiones sistemáticas desarrolladas en población colombiana y contextos comparables. Se incluyeron investigaciones con evaluación neuropsicológica estandarizada, modelos multivariados y diseños de intervención, abordando tanto población infantil expuesta a trauma como adultos con historia de ETT. Resultados: Los hallazgos indican que las ETT se asocian con alteraciones significativas en funciones ejecutivas, particularmente en la planificación, memoria de trabajo e inhibición (Montoya-Arenas et al., 2022). Asimismo, se evidencian déficits en cognición social y comportamiento adaptativo en niños expuestos a conflicto armado, los cuales pueden ser parcialmente modificables mediante intervención neuropsicológica (Villanueva-Bonilla et al.,

2023). Adicionalmente, la literatura muestra una relación consistente entre trauma infantil y mecanismos de desconexión moral, asociados a conductas agresivas y dificultades en la autorregulación (Ocampo-Osorio et al., 2024). Modelos explicativos recientes sugieren que estos efectos están mediados por variables psicopatológicas y factores socioeconómicos, que amplifican el impacto del trauma en el desempeño neurocognitivo adulto (Martínez-Morales, 2025). Discusión: Los resultados evidencian que el impacto de las ETT es heterogéneo y culturalmente mediado, configurando trayectorias neurocognitivas complejas. Un abordaje neuropsicológico transcultural permite comprender estas diferencias y orientar estrategias de intervención integrales, dirigidas tanto a la rehabilitación cognitiva como a la prevención del riesgo psicosocial.

Efecto de un entrenamiento computarizado de la memoria de trabajo sobre la conducta adaptativa en comparación con un entrenamiento tradicional de lápiz y papel en niños, niñas y adolescentes entre los 8 y 14 años con diagnóstico de discapacidad intelectual leve escolarizados en diferentes instituciones educativas del valle del Aburrá

Álvaro Alejandro Acosta Echavarría; David Andrés Montoya Arenas; Cecilia María Díaz Soto

Universidad de San Buenaventura

La discapacidad intelectual (DI) afecta significativamente el funcionamiento cognitivo y adaptativo, con una prevalencia estimada entre el 1 % y el 4 % de la población mundial. En respuesta, se han desarrollado diversas intervenciones para mejorar el desempeño funcional de esta población, entre ellas los programas de entrenamiento cognitivo computarizado. Sin embargo, la evidencia sobre su eficacia y efectividad la transferencia hacia habilidades adaptativas aún no es concluyente. El presente estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de un entrenamiento computarizado de memoria de trabajo sobre la conducta adaptativa, en comparación con un entrenamiento tradicional de lápiz y papel, en niños, niñas y adolescentes de 8 a 14 años con diagnóstico de discapacidad intelectual leve. Se utilizó un enfoque cuantitativo con diseño cuasi experimental y propósito de superioridad. Los

hallazgos se desviaron de la hipótesis original, pues fue el grupo que recibió el entrenamiento de formato tradicional el que evidenció una progresión palpable en áreas críticas como el lenguaje, la memoria verbal y la motricidad. Ello parece indicar que las intervenciones que son presenciales, guiadas y estructuradas tienen un potencial marcadamente superior para catalizar la transferencia funcional en este segmento poblacional. Aunque se puede concluir que ambas modalidades de entrenamiento impactan positivamente la memoria de trabajo y la conducta adaptativa, es evidente que el formato de enseñanza tradicional sobresale por su mayor efectividad cuando se aplica a la educación de niños y jóvenes con un diagnóstico de DI leve. Estos hallazgos invitan a reconsiderar el diseño y acompañamiento de las intervenciones digitales para lograr un mayor impacto funcional.

Agotamiento Parental: Experiencias Invisibles detrás de Trastornos del Neurodesarrollo

León Rodríguez

Universidad Externado de Colombia

Objetivo: Esta conferencia presenta los más recientes hallazgos sobre las experiencias de agotamiento parental en madres y padres de niños con diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo en Colombia. **Método:** la información se recolectó durante las fases 3.1. y 3.2 del estudio internacional sobre agotamiento parental, el cual se llevó a cabo en 42. En la fase 3.1 se aplicó la evaluación de agotamiento parental (PBA), una encuesta sociodemográfica y el cuestionario sobre necesidades especiales infantiles a 480 madres y padres colombianos. En la fase 3.2. se realizó un análisis de contenido a las entrevistas realizadas a 5 madres cuyos hijos tenían diagnósticos de trastornos del neurodesarrollo y que presentaban altas puntuaciones de agotamiento parental. **Resultados:** Se encontró una asociación significativa y positiva entre las necesidades de cuidado y las puntuaciones de agotamiento, contraste y hartazgo parental. Estas asociaciones fueron más fuertes en las madres con carreras

profesionales y con ingresos económicos medios. Los análisis de contenido resaltan que las madres con mayor agotamiento parental y con hijos con diagnósticos de trastornos parentales muestran experiencias de frustración con sus vidas profesionales, familiares y personales, fatiga física y mental extrema, hartazgo con su rol materno, desesperanza hacia el futuro y carencia de recursos psicosociales para cumplir con las expectativas que la sociedad y ellas se han impuesto sobre el cuidado de sus hijos, su profesión y vida personal. **Conclusiones:** la información recolectada permite corroborar positiva asociación entre las exigencias del cuidado de los hijos con trastornos del neurodesarrollo y las experiencias de agotamiento parental. No obstante, estas experiencias están moderadas por factores sociodemográficos y culturales, incrementando la vulnerabilidad dentro de las familias con madres profesionales y carencia de recursos psicosociales.

Deterioro de la Flexibilidad Cognitiva y Carga Alostática: Consecuencias Neuropsicológicas del Servicio de Guardia en Personal Militar.

Jesús Nazareno Rodríguez Espin, Gabriel Alexander Ordoñez Guzmán, Kati Maribel Rueda Espinoza

Universidad Casa Grande
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
Universidad Estatal de Milagro

Resumen: La operatividad militar exige una exposición crónica a turnos rotativos que alteran los ritmos circadianos, actuando como un estresor biológico que incrementa la carga alostática y compromete la integridad del lóbulo frontal. Esta investigación analiza el impacto de la desorganización circadiana y el estrés percibido en la flexibilidad cognitiva y la organización estratégica del personal. Mediante un diseño descriptivo-correlacional de corte transversal, se evaluó a los participantes utilizando el Test de Trazos (TMT-B) para medir la flexibilidad, la Figura Compleja de Rey-Osterrieth para determinar la capacidad de planificación viso-espacial, y el Cuestionario de Pittsburgh

(PSQI) junto a la Escala de Estrés Percibido (PSS-14) para cuantificar la carga psicofisiológica. Se anticipa que niveles elevados de estrés y mala calidad de sueño correlacionarán significativamente con errores de perseveración en el TMT-B y una ejecución fragmentada en la Figura de Rey, evidenciando un fallo en el sistema atencional supervisorio. Estos hallazgos demuestran cómo la privación de sueño potencia la reactividad al estrés y degrada las funciones ejecutivas de alto nivel, fundamentando la necesidad de protocolos de higiene de sueño y recuperación neurofisiológica para mitigar el riesgo operativo derivado del error humano en misiones críticas.

Repercusiones en memoria de trabajo y velocidad de procesamiento asociadas al consumo recreativo de cannabis en universitarios

Jorge Alberto Guzmán Cortés; Daniel Rodríguez Santos,
Javier Tadeo Sánchez Betancort y Fernando Bolaños Ceballos

Escuela Superior de Actopan-Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Consumo de Cannabis recreativo y sus repercusiones cognitivas en alumnos universitarios. Existe un incremento del consumo de cannabis a nivel mundial, especialmente entre jóvenes (ONU DC, 2023). Este fenómeno refleja una tendencia que merece un análisis de sus repercusiones en la salud. Diversas investigaciones señalan alteraciones a nivel cognitivo por el consumo de cannabis. El objetivo de investigación fue analizar si existen diferencias en el desempeño de Memoria de Trabajo y Velocidad de Procesamiento en adultos jóvenes universitarios consumidores y no consumidores de cannabis. Método: participaron 40 alumnos universitarios, mexicanos, de entre 18 y 25 años, agrupados en grupo control (n=20) y grupo

experimental (n=20), pareados por sexo y edad. Se utilizaron la prueba de Detección de Alcohol, Tabaco y Otras sustancias (OPS, 2011) y la Escala Wechsler de Inteligencia para Adultos IV (Wechsler, 2014). Resultados: Para el análisis de datos se utilizó el software Jamovi 2.6 (The Jamovi Project, 2025). Se realizó un análisis t de student para muestras independientes. Se observaron diferencias significativas en tareas que evalúan la memoria de trabajo a favor del grupo control ($p < .05$). Conclusiones: Los hallazgos del consumo de cannabis se asocian con un bajo rendimiento de la memoria de trabajo. Las disminuciones del rendimiento en estas tareas pueden tener consecuencias significativas en el desempeño académico, laboral y de la vida cotidiana.

Trastorno neurocognitivo mayor de tipo vascular en un caso de policitemia vera: a propósito de un caso clínico

Juan David Salazar Castro, Julián Carvajal-Castrillón, José Luis Ascencio Lancheros

Universidad CES
Universidad Católica Luis Amigó
Hospital Neurológico de Colombia

Introducción. La Policitemia Vera es una neoplasia mieloproliferativa crónica caracterizada por aumento de la masa eritrocitaria, hiperviscosidad sanguínea y mayor riesgo de eventos trombóticos. Aunque las complicaciones hematológicas y vasculares están bien documentadas, las manifestaciones neurológicas, en especial las cognitivas, han recibido menor atención en la literatura. Caso clínico. Se reporta el caso de un hombre de 53 años con diagnóstico de Policitemia Vera por mutación en el gen Janus quinasa 2 (JAK 2), que desarrolló un trastorno neurocognitivo mayor de origen vascular secundario a múltiples accidentes cerebrovasculares. El paciente recibió manejo por rehabilitación neuropsicológica, presentando mejoría cognitiva

y funcional al finalizar la intervención. Conclusiones. La rehabilitación neuropsicológica en el caso descrito permitió una recuperación funcional significativa, con mejoras en dominios cognitivos y reincorporación parcial del paciente a la vida productiva. A diferencia de la mayoría de los reportes previos, centrados en síntomas motores transitorios y en intervenciones médicas, este caso evidencia el papel central de la neuropsicología en la evolución clínica, destacando la necesidad de integrar la evaluación y el tratamiento neuropsicológico dentro del abordaje interdisciplinario de la Policitemia Vera, con el fin de detectar tempranamente las alteraciones cognitivas y promover una mejor calidad de vida.

Caracterización clínica y cognitiva de pacientes adultos con crisis funcionales no epilépticas

Juanita Arango Maya (3), Sofía Hurtado Montoya (3), Antonia Pardo Montes (3), José Fernando Zapata Berruecos (1), Mariana Torres Bustamante (1)

1. Hospital Neurológico de Colombia 2. Grupo de Investigación Psicología, Salud y Sociedad Universidad CES
3. Facultad de Psicología Universidad CES

Introducción: Las crisis funcionales no epilépticas (CFNE) son eventos paroxísticos que simulan crisis epilépticas pese a la ausencia de descargas eléctricas anormales. Suelen relacionarse con factores emocionales, psicosociales y comorbilidades psiquiátricas, lo que complejiza su diagnóstico y manejo. En Colombia, la evidencia sobre su caracterización clínica y neuropsicológica es limitada. **Objetivo:** Describir el perfil clínico, sociodemográfico y cognitivo de adultos con CFNE atendidos en un centro de referencia neurológico entre 2014 y 2024. **Método:** Estudio observacional, retrospectivo basado en historias clínicas, paraclínicos y evaluaciones neuropsicológicas. Se incluyeron pacientes adultos con diagnóstico de CFNE confirmado por un equipo interdisciplinario. **Resultados:** La muestra estuvo compuesta por 78 participantes,

principalmente mujeres (69.2%) con edad promedio de 39.1 ± 17.5 años y escolaridad mediana de 11 años. La epilepsia y la depresión fueron las comorbilidades más frecuentes (66.7%). En la evaluación neuropsicológica, la atención (86.5%) y la función ejecutiva (86.5%) fueron los componentes más frecuentemente alterado, seguido de alteraciones en la memoria (82.7%). **Conclusión:** Los hallazgos confirman la complejidad clínica y cognitiva de las CFNE y subrayan la necesidad de un abordaje interdisciplinario que considere de forma integrada los factores emocionales, contextuales y neuropsicológicos. El estudio aporta evidencia relevante en un contexto con investigación local limitada y resalta la importancia de fortalecer las rutas diagnósticas y promover investigaciones en población latinoamericana.

Metacognición y Autorregulación: Marcadores Neurocognitivos de Riesgo Académico en la Transición Universitaria mediante la Escala UEF-1

Kati Maribel Rueda Espinoza, Jesus Nazareno Rodriguez Espin, Erika Marizza Ruperte Lucero, Monica Elizabeth Zea Vera

UNEMI-Universidad Estatal de Milagro

El estudio de la transición a la educación superior en Ecuador revela que el éxito académico depende de la capacidad para transitar desde una instrucción externa hacia una autorregulación prefrontal autónoma, proceso crítico considerando que las estructuras frontales completan su maduración entre los 25 y 30 años. Bajo este marco, la presente investigación busca determinar la incidencia de la autorregulación conductual y el monitoreo metacognitivo en el perfil de riesgo académico de estudiantes de primer semestre mediante la escala UEF-1. Metodológicamente, se emplea un diseño descriptivo-correlacional

aplicando dicho instrumento, el cual posee una consistencia interna validada entre $\alpha=0.71$ y 0.85 . Se anticipa que puntuaciones bajas en las dimensiones de verificación del cumplimiento de objetivos (ítems 20, 23, 30) y regulación consciente de la conducta (ítems 3, 11, 19) actuarán como marcadores de un ajuste estratégico deficiente. Estos hallazgos evidenciarán fallas en la anticipación de metas y control de impulsos que elevan el riesgo de deserción, fundamentando programas de intervención neuropsicológica orientados a fortalecer la autonomía ejecutiva y asegurar la permanencia estudiantil.

Factores de riesgo biopsicosocial asociados a deterioro cognitivo leve en adultez mayor

Carlos Rincón, Tatiana Echeverría, Anith Monroy

Docente tiempo completo Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)
Psicóloga egresada UPTC
Psicóloga egresada UPTC

El deterioro cognitivo leve (DCL) se considera un estado intermedio entre el envejecimiento cognitivo normal y la demencia, con una tasa anual de conversión estimada entre el 10% y el 15%. El objetivo del estudio fue identificar factores de riesgo biopsicosocial asociados a diferentes categorías de DCL en población adulta mayor. El estudio se desarrolló desde el paradigma empírico-analítico, con enfoque cuantitativo, diseño no experimental, descriptivo y de corte transversal. Participaron adultos mayores con edades entre 60 y 80 años, a quienes se les aplicó un protocolo de evaluación compuesto por múltiples pruebas neuropsicológicas para valorar distintos dominios cognitivos, junto con una ficha de identificación de factores de riesgo biopsicosociales. Los resultados evidencian que diversos factores sociales se asocian con la presencia de DCL, entre ellos

la ocupación informal, la no jubilación, la residencia en zonas rurales, bajos niveles educativos y escasos ingresos económicos. En relación con los factores biológicos, la diabetes se identificó como un factor de riesgo significativo, posiblemente debido a su influencia en la circulación cerebral y los procesos de neuroinflamación. Por el contrario, no se encontró una asociación significativa entre el DCL y la presencia de comorbilidades generales, antecedentes familiares de demencia, consumo de sustancias psicoactivas ni sintomatología depresiva en la muestra evaluada. En conclusión, los hallazgos indican que ciertos factores sociodemográficos y la diabetes se asocian de manera significativa con el DCL en adultos mayores, lo que resalta la importancia de considerar variables biopsicosociales en la detección temprana y prevención del deterioro cognitivo

Adaptación y Validación de un Protocolo para Intervención a Familiares de Pacientes con Cáncer: traslación de la Neurorrehabilitación a la Psicooncología en Colombia

Tatiana Manrique Zuluaga (1 y 2), Tamara Rosa Calvache (1), Luisa María Forero (3), Leydy Marieth Lozano (1 y 6), Mónica Marín (4), Santiago Moreno (2 y 5), María Camilia Pérez (5), Juan Carlos Arango-Lasprilla (6)

1. Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic.
2. Grupo de investigación E.C. Estudios en Ciencias del Comportamiento
3. Liga Colombiana Contra el Cáncer
4. Instituto Nacional de Cancerología - Medellín
5. MindPsic SAS
6. Universidad Industrial de Santander
7. IKERBASQUE. Basque Foundation for Science

Las enfermedades de alto costo, como el cáncer y las secuelas neuropsicológicas derivadas de lesiones neurológicas, desestabilizan el sistema familiar y generan retos crónicos en salud mental. El protocolo de Lehan et al., (2017), validado en Latinoamérica y Europa, demostró que la intervención sistémica reduce la carga del cuidador y mejora la interacción familiar.

Se justifica su traslación al ámbito oncológico reconociendo que los familiares son el recurso principal para el cuidado a largo plazo. Por ello, es importante priorizar el fortalecimiento de la red de apoyo sobre la psicoeducación aislada de cuidadores, mediante un ambiente de contención, empatía y sentido de pertenencia que favorecerá la adherencia al tratamiento y el

bienestar integral del paciente. La validación del protocolo de intervención familiar en seis sesiones para familias de pacientes oncológicos en Colombia, utiliza un diseño cuasi-experimental pre-post. La intervención aborda el significado de enfermedad, regulación emocional, comunicación y resolución de problemas, incorporando la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) aportando a la calidad de vida del sistema familiar. Se anticipa que la estandarización de este modelo en la práctica oncológica replicará los beneficios

observados en neurorrehabilitación, mitigando niveles de depresión, ansiedad y carga del cuidador. Al fortalecer la resiliencia familiar mediante un enfoque interdisciplinario a través de intervenciones basadas en evidencia, se optimizan los recursos de salud mental desde un enfoque interdisciplinario. Este modelo de atención humanizada y costo-efectivo acoge miedos e incertidumbres del sistema familiar, garantizando una mejora sustancial en la calidad de vida del paciente y su entorno.

Factores relacionados con las alteraciones intelectuales en niños y adolescentes con epilepsia

Ricardo Montoya Monsalve¹, Daniela Sánchez Acosta², María Carolina Restrepo Chica³, María Camila Díaz Garcés⁴ y Julián Carvajal-Castrillón⁵

1. Psicólogo. Magíster en Neuropsicología Clínica. Docente investigador del grupo de Investigación en Psicología, Salud y Sociedad de la Universidad CES. Facultad de Psicología. Universidad CES, Medellín, Colombia. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-0175-0271>
- . Autor de correspondencia. Correo: rmontoya@ces.edu.co Dirección: Calle 10A #22-04 (Medellín, Antioquia, Colombia). Teléfono: +57 (604)4440555 Ext. 1175.
2. Psicóloga. Magíster en Salud Mental de la Niñez y la Adolescencia. Docente investigadora del grupo de Investigación en Psicología, Salud y Sociedad de la Universidad CES. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1665-9718>
3. Psicóloga. Magíster en Neuropsicología Clínica del Instituto Neurológico de Colombia. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5183-9143>
4. Psicóloga. Magíster en Neuropsicología Clínica. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4728-611X>
5. Neuropsicólogo clínico del Instituto Neurológico de Colombia. Coordinador Maestría en Neuropsicología Clínica Universidad CES. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4040-0135>

Objeto: Esta investigación analiza los factores relacionados con alteraciones intelectuales en niños y adolescentes con epilepsia. **Metodología.** Estudio correlacional, transversal y retrospectivo donde se analizaron 341 historias clínicas de pacientes entre 7 y 17 años con diagnóstico de epilepsia. **Resultados.** El 52% de los pacientes presentó un coeficiente intelectual inferior a 80. Los pacientes con crisis focal mostraron 2.2 veces más probabilidades de presentar capacidad intelectual inferior. Las principales alteraciones cognitivas relacionadas a la inteligencia fueron en dominios como atención (88.2%), funciones ejecutivas (84.6%) y memoria (60.1%).

Discusión. Los hallazgos sugieren que la epilepsia, especialmente la focal, afecta significativamente la capacidad intelectual y el funcionamiento cognitivo. Tanto la monoterapia como la politerapia farmacológica presentaron alteraciones similares en los procesos cognitivos evaluados. **Conclusiones.** La epilepsia pediátrica impacta negativamente la capacidad intelectual global y procesos cognitivos específicos. Se recomienda implementar protocolos de evaluación neuropsicológica para identificar tempranamente estas alteraciones y diseñar intervenciones personalizadas que mejoren la calidad de vida de estos pacientes.

Evaluación neuropsicológica, capacitación docente y propuesta de intervención escolar de procesos atencionales, mecanismos de control inhibitorio y memoria de trabajo en México.

Blasio Duarte, Miguel Angel; Ochoa Gutiérrez, Karla Stephania; Guzmán Perea, Juan Gabriel; Delgado Mejía, Iván Darío.

Hospital Infantil Privado (Ciudad de México).
Asociación Mexicana de Neuropsicología (AMN).

El presente estudio corresponde a una fase de evaluación neuropsicológica basal y el desarrollo de una propuesta de intervención orientada a la estimulación de la atención sostenida, la memoria de trabajo, control inhibitorio, así como, neuroeducación de procesos cognitivos básicos para el aprendizaje dirigida a docentes. La muestra fue de 79 infantes escolarizados de 6 a 9 años. Para evaluar procesos atencionales se utilizó Aula Nesplora y la memoria de trabajo fue evaluada mediante las subpruebas Retención de Dígitos y Sucesión de Números y Letras de la Escala Wechsler de Inteligencia para Niños (WISC-IV). En los resultados obtenidos el 46% presenta un rendimiento bajo o muy bajo en control inhibitorio, el 57% un desempeño con rendimiento bajo o muy bajo en atención sostenida mientras que el 88% presentó

un rendimiento promedio o promedio bajo en memoria de trabajo. Así mismo los docentes capacitados no contaban con la información relacionada a procesos básicos cerebrales para el aprendizaje. Con base a los resultados obtenidos se diseñó una programa de estimulación cognitiva de aplicación sistematizada en formato audio visual de 65 sesiones, respecto a la capacitación docente abarcó los neuromitos y los procesos cognitivos que impactan el aprendizaje. En conclusión al presentar un desarrollo de la atención sostenida baja y fallas en el control inhibitorio en contextos escolares puede asociarse a las dificultades de aprendizaje, regulación conductual y emocional por lo que la neuroeducación docente e intervención neuropsicológica escolar es fundamental para el desarrollo integral de los niños en México.

Configuraciones Neurocognitivas del Aprendizaje Virtual: Un Enfoque Pletogénico apoyado en Educational Data Mining

Monica Elizabeth Zea Vera, Erika Marizza Ruperte Lucero, Kati Maribel Rueda Espinoza,

UNEMI-Universidad Estatal de Milagro

El crecimiento sostenido de los entornos virtuales de aprendizaje ha evidenciado la necesidad de comprender el desempeño académico desde marcos integradores que trasciendan los modelos lineales tradicionales. En este contexto, la neuropsicología permite analizar el aprendizaje como un proceso sustentado en configuraciones neurocognitivas dinámicas, donde interactúan funciones ejecutivas, procesos atencionales y memoria de trabajo en estrecha relación con variables contextuales. El objetivo de este estudio fue identificar y analizar las configuraciones neurocognitivas asociadas al aprendizaje en entornos virtuales, mediante la integración de técnicas de Educational Data Mining (EDM) y la lógica pletogénica como marco epistemológico. Se consideraron variables académicas y sociodemográficas —procedencia, regularidad académica, condición de repetidor, sexo y perfil sociodemográfico— en interacción con indicadores de comportamiento en plataformas virtuales. La metodología correspondió a un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y alcance explicativo.

Se analizaron datos académicos y de interacción digital de estudiantes en programas STEM en modalidad virtual mediante técnicas de minería de datos y análisis multivariante. Este enfoque permitió identificar patrones complejos y relaciones no lineales entre variables, configurando perfiles diferenciados de funcionamiento neurocognitivo. Los resultados evidencian que el aprendizaje en entornos virtuales emerge de configuraciones multicausales en las que la regularidad académica y la participación activa se asocian con mayores niveles de autorregulación, mientras que la condición de repetidor y ciertas características sociodemográficas se vinculan con patrones de menor eficiencia en procesos ejecutivos. Se concluye que la integración del EDM y la lógica pletogénica permite comprender el aprendizaje como un sistema dinámico de configuraciones neurocognitivas, aportando bases para intervenciones neuroeducativas personalizadas. Configuraciones Neurocognitivas, Educational Data Mining, Lógica Pletogénica, Aprendizaje Virtual, Funciones Ejecutivas

Terapias no farmacológicas para la enfermedad de Alzheimer

Ricardo Montoya, Susana Alvarez, Ana Isabel Muñoz, Juan Camilo Cuenca.

Universidad CES - Colombia - Programa de Psicología.

Este artículo presenta una revisión de literatura que analiza la evidencia científica disponible sobre las terapias no farmacológicas en la enfermedad de Alzheimer. Esta patología neurodegenerativa progresiva constituye la principal causa de demencia en la población adulta mayor y se asocia con un deterioro gradual de la memoria y de otras funciones cognitivas, lo cual impacta de manera significativa la autonomía funcional del paciente y la calidad de vida de su entorno cuidador. Desde un enfoque teórico y clínico, el artículo contextualiza la enfermedad a partir de sus principales bases neuropatológicas, incluyendo la acumulación de péptido β -amiloide, la hiperfosforilación de la proteína tau y los procesos de neurodegeneración descritos en el modelo AT(N), propuesto por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer. Este marco conceptual permite comprender la complejidad del cuadro clínico y

sustenta la necesidad de abordajes terapéuticos complementarios al tratamiento farmacológico. La revisión se desarrolló mediante la consulta de bases de datos científicas nacionales e internacionales, seleccionando artículos publicados principalmente en los últimos diez años, bajo criterios de calidad metodológica y relevancia temática. A partir del análisis de los estudios incluidos, se identificaron diversas intervenciones no farmacológicas, como la estimulación cognitiva, la musicoterapia, la arteterapia, la terapia ocupacional y la actividad física. Los hallazgos evidencian que estas intervenciones generan beneficios a nivel cognitivo, emocional y funcional, contribuyendo al enlentecimiento del deterioro y a la mejora del bienestar integral del paciente. En conjunto, la evidencia respalda el valor de las terapias no farmacológicas como un componente esencial dentro del manejo integral de la enfermedad de Alzheimer.

Resultados preliminares de una propuesta de rehabilitación cognitiva para pacientes con COVID prolongado

Carolina Hurtado Montoya¹, Diego Fernando Rojas Gualdrón², Ricardo Montoya Monsalve³, Julián Santiago Carvajal Castrillón³, Manuela Jiménez Cárdenas⁴, Mariana Campuzano Sierra⁵, Sofía Jiménez Esteban⁵, Sebastián Álvarez Zuluaga⁵, María Paula Alviar Ortiz⁵, Santiago Vasquez Builes⁶, Mariana Arroyave Bustamante⁷, Esteban Agudelo Quintero⁷, Juliana Vélez Arroyave⁷, Vanessa Julieth Pulgarín Muriel⁴, Sara Martínez Gallego⁴, Isabel Cristina Bolívar Lopera⁴, Astrid Andrea Arias Villa⁴, Carolina Lotero Lotero⁴, Catalina Ruiz⁴, Estefanía Botero Mesa⁴, Laura Marcela Cortés Yepes⁴, Stefanía Abaunza Torres⁴, Sofía Hurtado Montoya⁴, Valentina Cortés Barrios⁴, Yina Quique⁸, Igor Jerome Koralnik⁹

1. Grupo de Investigación en Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad CES, Medellín, Colombia
2. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad CES, Medellín, Colombia
3. Grupo de Investigación Psicología Salud y Sociedad. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad CES, Medellín, Colombia
4. Maestría en Neuropsicología Clínica. Universidad CES, Medellín, Colombia
5. Médico(a) general. Universidad CES, Medellín, Colombia
6. Neurólogo clínico. Hospital Neurológico de Colombia.
7. Residente de especialidad en Neurología Clínica. Universidad CES, Medellín, Colombia
8. Speech and Hearing Sciences. University of New Mexico, EEUU
9. The Ken & Ruth Davee Department of Neurology. Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, United States

Objetivo: Describir resultados preliminares de la adaptación de un protocolo de rehabilitación cognitiva en personas con COVID prolongado. Método: Estudio

cuantitativo con mediciones pre -pos sin grupo control (n=16). La intervención está basada en 6 sesiones realizadas por estudiantes de maestría en Neuropsicología

Clínica de la Universidad CES y divididas en 3 módulos: atención, función ejecutiva y memoria. Como variables de desenlace se encontraba la función cognitiva subjetiva medida por el PROMIS y mediciones cognitivas objetivas por el NIH Toolbox. La interpretación se realizó con puntuaciones T e intervalo de confianza al 95%. Resultados: Se encontró un promedio de edad de 43,5 (DE = 12.2), siendo 6 hombres y 10 mujeres. Además, 4 presentaban antecedente patológico personal neurológico y 9 con antecedente patológico familiar neurológico. Se observaron mejoras estadísticamente significativas en la mayoría de los desenlaces evaluados; como la función cognitiva subjetiva (diferencia

de medias: 12.50; IC 95%: 8.59–16.41; $p < 0.0001$), seguida de velocidad de procesamiento (10.10; IC 95%: 2.89–17.31; $p = 0.010$), atención y función ejecutiva (8.50; IC 95%: 3.26–13.74; $p = 0.004$) y atención (8.00; IC 95%: 1.92–14.08; $p = 0.013$). En cuanto a los síntomas psiquiátricos, se redujeron significativamente ansiedad (–11.80; IC 95%: –16.17 a –7.43; $p < 0.0001$) y depresión (–8.10; IC 95%: –12.79 a –3.41; $p = 0.002$). Por su parte, la fatiga también tuvo mejoría (–11.10; IC 95%: –17.75 a –4.45; $p = 0.003$). Conclusiones: Estos resultados preliminares sugieren un impacto positivo del protocolo, a nivel cognitivo objetivo y subjetivo, en pacientes con COVID prolongado.

Los 10 Principios y Estándares Globales de Competencia Profesional, Ética y Equidad para el uso de la IA en Psicología

Tatiana Manrique Zuluaga, Stewart Dueñas Trejos

Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic

Frente a la rápida integración tecnológica en salud mental, la Global Psychology Alliance (GPA) formuló los ‘10 Principios para la IA en la Práctica, Formación e Investigación’. Este consenso de más de 80 países unifica criterios éticos y técnicos globales. Como miembro de la GPA, Colpsic participó en su redacción para garantizar que la realidad de la psicología colombiana y latinoamericana estuviera representada, asegurando un lenguaje común para una atención culturalmente sensible. Los 10 principios se organizan en tres clústeres estratégicos: Ética y Transparencia, basadas en la Responsabilidad Ética (P1), la Transparencia (P2) y la obligatoriedad del Consentimiento Informado (P3) sobre el uso de datos. La Competencia Profesional exige una Base de Evidencia (P4) sólida y garantiza la Supervisión Humana (P5), priorizando la

Seguridad Psicológica (P6) para prevenir daños clínicos. El Acceso e Inclusión obligan a la Validación Científica (P7), la mitigación del Sesgo Algorítmico (P8), la promoción de la Equidad (P9) y la Gobernanza Profesional (P10). Para la psicología en Colombia, estos principios actúan como brújula ante vacíos legales, protegen la soberanía del juicio clínico frente a la automatización y aseguran que las herramientas de IA no perpetúen sesgos culturales ajenos a nuestra realidad. Al adoptar este marco, el profesional en psicología garantiza una práctica con estándares internacionales que protegen la dignidad humana y la precisión diagnóstica. Es un llamado urgente a integrar la alfabetización digital en los currículos para que los psicólogos lideren, con idoneidad y ética, la gobernanza de la salud mental en el país.

Entre o saber e o sentir: prácticas de cuidado ampliado às famílias neurodiversas

Tatiana Oliveira Serra

Este estudio discute la integración entre el conocimiento técnico y la experiencia emocional en el cuidado de familias de personas neurodiversas, con énfasis en el Trastorno del Espectro Autista (TEA). La evidencia indica que niveles elevados de estrés parental se asocian con una menor adherencia y una reducción en la eficacia de las intervenciones, impactando directamente en

los resultados del desarrollo infantil. En este contexto, se hace necesario ampliar el foco clínico más allá del niño, incorporando el cuidado sistemático de los cuidadores. A partir de referentes de la Análisis de la Conducta Aplicada (ABA) y la neuropsicología, se propone un modelo de cuidado ampliado que integra orientación técnica, apoyo emocional y estrategias dirigidas

a la calidad de vida de las familias. Entre las intervenciones se destacan los programas de entrenamiento parental, la creación de espacios estructurados de escucha y acogida, grupos de apoyo y acciones orientadas a la reanudación de actividades significativas, así como al fortalecimiento de la autonomía de los cuidadores. Se argumenta que la ampliación del foco interventivo hacia el contexto familiar favorece un mayor

compromiso, la generalización de habilidades y la continuidad del tratamiento. La articulación entre saber y sentir se configura, así, como un eje estructurante para prácticas clínicas más eficaces, humanizadas y sostenibles. Se concluye que el cuidado ampliado a las familias constituye un componente esencial para la reducción del estrés parental y la promoción de resultados más consistentes en el desarrollo infantil.

Variables neuropsicológicas y rendimiento académico: un análisis correlacional

Yenly Laya Machado Sánchez

Colegio y Centro de Arte Juvenil

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el rendimiento académico y tres variables neuropsicológicas: la velocidad de procesamiento, la lateralidad y los movimientos sacádicos en estudiantes de tercero y cuarto grado de educación primaria. Específicamente, se describieron las características de la lateralidad de los participantes, se evaluaron los movimientos sacádicos y la velocidad de procesamiento mediante las subpruebas correspondientes del WISC-IV y se analizó la relación de estas variables con el rendimiento académico. Los resultados evidenciaron que el 55,7 % de los estudiantes presentó dificultades de lateralización, observándose una mayor proporción de lateralidad consolidada en cuarto grado (50 %) en comparación con tercero (35,7 %). En relación con los movimientos sacádicos, el 69,4 % de los participantes completó la tarea dentro del tiempo esperado; sin embargo, solo el 47,4 % obtuvo un desempeño adecuado

considerando el número de errores. Respecto a la velocidad de procesamiento, únicamente el 47,2 % alcanzó niveles medios o medio-altos, mientras que el 52,8 % obtuvo puntuaciones inferiores a las esperadas para su edad. Asimismo, los estudiantes de cuarto grado mostraron un mejor desempeño en velocidad de procesamiento que los de tercero. El análisis correlacional reveló asociaciones significativas entre el rendimiento académico y las variables neuropsicológicas estudiadas. El tiempo empleado en la tarea de movimientos sacádicos presentó la correlación más alta con el rendimiento académico ($r = -0,42$), especialmente en el área de Lengua Castellana. Además, la lateralidad y la velocidad de procesamiento mostraron relaciones significativas con el desempeño escolar. Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar estos procesos neuropsicológicos como factores asociados al rendimiento académico durante la educación primaria.

Impacto de la exposición a pantallas en el desarrollo de las funciones ejecutivas en la infancia: Una revisión sistemática

Melisa Pertica

La exposición a medios de pantallas genera preocupación a nivel mundial en la población infantil. Diversas entidades como la Organización mundial de la Salud (OMS, 2019), la Academia Americana de Pediatría (AAP, 2016) y la Sociedad Argentina de Pediatría (2017), han advertido una serie de recomendaciones sobre el uso de estos aparatos tecnológicos, debido a la vulnerabilidad del sistema nervioso en las primeras etapas de la vida. El objetivo del presente trabajo es conocer el impacto de los medios de pantallas en el desarrollo de las funciones ejecutivas de niños menores de 6 años. Metodología: se llevó a cabo mediante una revisión sistemática con artículos disponibles desde el 2014 hasta el 2024. Resultados: 1797 fueron los registros obtenidos de la búsqueda, de los cuales solo 7 cumplieron con los

requisitos para ser incluidos en esta revisión. Conclusiones: Se encontró que el contenido fantástico puede impactar negativamente en el control atencional, la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo (Lillard et al., 2015; Rhodes et al., 2019). El exceso de tiempo recomendado para observar las pantallas puede ser un factor que exacerbe conductas externalizadoras y fallas en el control atencional (Tamana, et al., 2019). Se observó mejor rendimiento en funciones ejecutivas, específicamente en la memoria de trabajo y el control atencional cuando se utilizan medios de pantallas interactivos (Huber et al., 2018; McNeill et al., 2021). Por el contrario, cuando el contenido de pantallas no era dirigido a niños, hubo peor rendimiento en tareas de control atencional (Portugal et al., 2022).

Impacto de la Depresión en las Funciones Ejecutivas en Pacientes con Contusión Temporal sometidos a Drenaje Quirúrgico

Carlos Alberto Hurtado González ^{1,2,3,5}, Juan Felipe Ayala Rico ⁴, Oscar escobar Vidarte ^{1,2}, Cesar Quintero Moreno ^{1,2}, Sebastián Ordonñez Cure ^{1,2}

1. Sección de Neurocirugía, Facultad de Medicina, Universidad del Valle, Cali, Colombia
2. Departamento de Neurocirugía, Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia
3. Facultad de Medicina, Universidad del Valle, Cali, Colombia
4. Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Universidad Cooperativa de Colombia. Cali, Colombia.
5. Facultad de Medicina - Especialidad de Psiquiatría. Universidad Libre Seccional Cali

Objetivo: Determinar el impacto de la depresión en el funcionamiento ejecutivo en pacientes con Contusión Temporal que han requerido drenaje Quirúrgico. Metodología: Diseño de investigación no experimental transversal descriptivo. Participantes: se reclutaron 38 participantes (32 hombres y 6 mujeres) diagnosticados con Traumatismo Craneoencefálico (TCE) con contusiones temporales, los cuales se sometieron a una intervención quirúrgica mediante craneotomía, con una edad media de $35,31 \pm 14,8$ años. Materiales: se utilizó el Inventario de Depresión de Beck (BDI), la Batería de Evaluación Frontal (FAB), la Historia de Badcock para memoria inmediata y diferida y para la retención de dígitos

se utilizó el Spam de la escala de Weschler. Resultados: Existe correlación negativa estadísticamente significativa entre la puntuación total de la BDI y la puntuación total de la FAB ($Rho = -.489; p = .001$), igualmente relación significativa en la evaluación de la Memoria Inmediata ($Rho = -.343; p = .002$) y memoria diferida ($Rho = -.389; p = .001$). No se encontró relación significativa entre la BDI y el Spam de atención ($Rho = -.111; p = .323$). Conclusiones: La depresión impacta de manera significativa en las funciones ejecutivas de pacientes con contusión temporal sometidos a drenaje quirúrgico, es importante diseñar planes de acción que estén encaminados a generar mayor reserva neurocognitiva en este tipo de pacientes.

Impacto de la Ansiedad en las Actividades Básicas, Instrumentales y Avanzadas de la Vida Diaria en Pacientes con Contusión Temporal Sometidos a Drenaje Quirúrgico

Carlos Alberto Hurtado González ^{1,2,3,5}, Juan Felipe Ayala Rico ⁴, Oscar escobar Vidarte ^{1,2}, Sebastián Ospina Otalvaro ⁴, Cesar Quintero Moreno ^{1,2}, Sebastián Ordoñez Cure ^{1,2}, Lina María Villegas Trujillo ¹

1. Sección de Neurocirugía, Facultad de Medicina, Universidad del Valle, Cali, Colombia
2. Departamento de Neurocirugía, Hospital Universitario del Valle, Cali, Colombia
3. Facultad de Medicina, Universidad del Valle, Cali, Colombia
4. Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Universidad Cooperativa de Colombia. Cali, Colombia.
5. Facultad de Medicina - Especialidad de Psiquiatría. Universidad Libre Seccional Cali

Objetivo: Identificar el impacto de la ansiedad sobre las actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria (ABIADV) en pacientes con Contusión Temporal sometidos a Drenaje Quirúrgico. **Metodología:** Diseño de investigación no experimental transversal descriptiva. **Participantes:** se reclutaron 38 participantes (32 hombres y 6 mujeres) diagnosticados con Traumatismo Craneoencefálico (TCE) con contusiones temporales y que se sometieron a un drenaje quirúrgico, con una edad media de $35,31 \pm 14,8$ años. **Materiales:** se utilizó la Escala de Ansiedad de Hamilton (HAM-A), el Índice de Barthel y la Escala de Lawton y Brody para la evaluación de las ABIADV.

Resultados: Existe una correlación negativa estadísticamente significativa entre la puntuación de la HAM-A y la puntuación total del Índice de Barthel ($Rho = -,291$; $p = ,008$), de igual forma, existe correlación negativa estadísticamente significativa entre la puntuación de la HAM-A y la puntuación total de la Escala de Lawton y Brody ($Rho = -,322$; $p = ,003$). **Conclusiones:** La sintomatología ansiosa influye negativamente y de manera directa en la funcionalidad e Independencia de los pacientes con contusión temporal sometidos a drenaje quirúrgico, lo que representa una perspectiva clínica necesaria para sustentar procesos de intervención y rehabilitación funcional.

Influencia de la Apatía en el Fenotipo Cognitivo Específico en Pacientes Diagnosticados con Enfermedad de Parkinson Idiopático sin Demencia

Julián Camilo Cedeño Buitrago³, Carlos Alberto Hurtado González^{1,2,3}, Juan Felipe Ayala Rico¹, Sebastián Ospina Otalvaro¹, Juan Diego Trujillo Torres³, Sofía Zapata Vargas³, Miguel Ángel Aristizabal Marmolejo³, Laura Sofía Idrobo Benavidez³, Lady Montañón³

1. Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Universidad Cooperativa de Colombia. Cali, Colombia.
2. Facultad de Medicina - Especialidad de Psiquiatría. Universidad Libre Seccional Cali
3. Facultad de Medicina. Universidad Libre Seccional Cali

Objetivo: Identificar la influencia de la apatía en el fenotipo cognitivo en pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopático sin Demencia (EPISD). **Metodología:** Diseño de investigación no experimental transeccional descriptivo. **Participantes:** se reclutaron 50 pacientes diagnosticados con EPISD, con una edad media de 64,85 años. **Materiales:** se utilizó la Escala de Evaluación de Apatía de Marín para la valoración de la sintomatología apática y la Escala de evaluación cognitiva de la enfermedad de Parkinson (PD-CRS). **Resultados:** Existe una correlación negativa estadísticamente significativa entre la puntuación total de la Escala de Apatía

de Marín y el Test del Reloj en modalidad Espontánea ($Rho = -,281$; $p = ,048$). No existe correlación alguna entre la Escala Apatía y otros subdominios de la PD-CRS como lo son memoria Inmediata ($Rho = -,117$; $p = ,417$), Denominación ($Rho = -,185$; $p = ,197$), Atención Mantenedora ($Rho = -,063$; $p = ,665$), Memoria Operativa ($Rho = -,168$; $p = ,245$), Test del Reloj Modalidad de copia ($Rho = -,047$; $p = ,747$), Memoria Diferida ($Rho = -,039$; $p = ,788$), Fluidez verbal alternante ($Rho = -,117$; $p = ,418$) y fluidez verbal de acción ($Rho = -,012$; $p = ,932$). **Conclusiones:** La apatía afecta el funcionamiento visuoespacial evaluado por el test del reloj en su forma espontánea.

Análisis Correlacional entre la Ansiedad y el Fenotipo Cognitivo en Pacientes Diagnosticados con Enfermedad de Parkinson Idiopático sin Demencia

Juan Felipe Ayala Rico¹, Carlos Alberto Hurtado González^{1,2,3}, Armando Lucumi Moreno³, Paola Andrea Gutiérrez Lenis¹, Sebastián Ospina Otalvaro¹, Karol Stayci Ponce Gil¹, Hanna Paola Cruz Ordóñez¹, Julián Alexander Palacios Fonseca¹, Julián Camilio Cedeño Buitrago³, Juan Diego Trujillo Torres³, Lady Montañó³

1. Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Universidad Cooperativa de Colombia. Cali, Colombia.
2. Facultad de Medicina - Especialidad de Psiquiatría. Universidad Libre Seccional Cali
3. Facultad de Medicina. Universidad Libre Seccional Cali

Objetivo: Identificar la correlación clínica entre la ansiedad y el fenotipo cognitivo en pacientes con Enfermedad de Parkinson Idiopática sin Demencia (EPISD). **Metodología:** Diseño de investigación transeccional descriptivo. **Participantes:** se reclutaron 50 pacientes diagnosticados con EPISD, con una edad media de 64,85 años. **Materiales:** se utilizó la Escala de Ansiedad de Hamilton (HAM-A) y la Escala de Valoración de Demencia (DRS-2).

Resultados: No existe una correlación estadísticamente significativa entre la puntuación total de la HAM-A y la puntuación total de la DRS-2 ($Rho = -0,165$; $p = 0,253$), de igual forma tampoco existe una relación

significativa entre la ansiedad de la HAM-A y los subdominios de la DRS-2 de Atención ($Rho = -0,120$; $p = ,403$), Iniciación/Perseveración ($Rho = 0,159$; $p = 0,270$), Construcción ($Rho = -0,098$; $p = 0,498$), Conceptualización ($Rho = -0,197$; $p = 0,171$) y Memoria ($Rho = -0,143$; $p = 0,323$). **Conclusiones:** Se destaca que no existen relaciones significativas entre la sintomatología ansiosa evaluada mediante la HAM-A y el fenotipo cognitivo evaluado con la DRS-2, o alguno de sus dominios. Se recomienda que para futuras investigaciones se tengan en cuenta evaluaciones con diferentes instrumentos y una mayor muestra representativa que permita objetivar estos resultados.

Influencia de la Depresión en la Calidad de Vida de Pacientes Diagnosticados con Enfermedad de Parkinson Idiopático sin Demencia

Carlos Alberto Hurtado González^{1,2,3}, Juan Felipe Ayala Rico¹, Armando Lucumi Moreno³, Paola Andrea Gutiérrez Lenis¹, Sebastián Ospina Otalvaro¹, Karol Stayci Ponce Gil¹, Hanna Paola Cruz Ordóñez¹, Julián Alexander Palacios Fonseca¹, Shirley Milena Rojas¹, Julián Camilio Cedeño Buitrago³, Juan Diego Trujillo Torres³, Lady Montañó³

1. Departamento de Psicología Básica, Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Universidad Cooperativa de Colombia. Cali, Colombia.
2. Facultad de Medicina - Especialidad de Psiquiatría. Universidad Libre Seccional Cali
3. Facultad de Medicina. Universidad Libre Seccional Cali

Objetivo: Identificar la influencia de la depresión en la calidad de vida (CDV) en pacientes con enfermedad de Parkinson idiopática sin demencia (EPISD). **Metodología:** Diseño de investigación transeccional descriptiva. **Participantes:** se reclutaron 50 pacientes diagnosticados con EPISD, con una edad media de 64,85 años. **Materiales:** se utilizó la Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (GDS) para la evaluación de la Sintomatología Depresiva y la escala de CDV (PDQ-39) en la EPISD. **Resultados:** Existe correlación estadísticamente significativa entre la puntuación de la GDS y la puntuación total

del PDQ-39 ($Rho = ,606$; $p = 0,001$); existe también una relación significativa entre la depresión de la GDS y los subdominios de la PDQ-39 de Movilidad ($Rho = ,448$; $p = 0,001$), actividades de la vida diaria ($Rho = ,421$; $p = 0,001$), Bienestar Emocional ($Rho = ,491$; $p = 0,001$), Estigma ($Rho = ,381$; $p = 0,000$), Soporte Social ($Rho = ,450$; $p = 0,001$) y Malestar Corporal ($Rho = ,306$; $p = 0,031$). **Conclusiones:** La depresión afecta la CDV en pacientes con EPISD, es importante diseñar técnicas de rehabilitación cognitiva que tengan como objetivo ralentizar el deterioro neurológico.

VII Congreso Iberoamericano de Neuropsicología y V congreso Colombiano de Neuropsicología. Cartagena, Colombia. Septiembre 23 al 25 de 2026

PRESENTACIONES ORALES

Neurocovid: síntomas neurológicos y cognitivos asociados a COVID persistente

Manuela Cardona Quintero, Mariana Vera Arango, Ricardo Montoya Monsalve

Afiliación: Universidad CES

En los últimos cinco años, múltiples investigaciones han evidenciado que el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) puede causar secuelas duraderas no solo en el sistema respiratorio, sino también en el sistema nervioso central y periférico. Este conjunto de síntomas persistentes, físicos y neurológicos, se le ha denominado Long COVID cuando duran más de 3 meses. Ante la creciente evidencia de síntomas neurológicos prolongados (NeuroCOVID), es fundamental sintetizar los hallazgos sobre sus manifestaciones cognitivas, emocionales, conductuales y sus cambios biológicos asociados. Se realizó una revisión en bases de datos como ScienceDirect, Scopus, ClinicalKey, SpringerLink, Scielo, MedLine y PubMed, incluyendo estudios originales y revisiones sobre manifestaciones neurológicas y cognitivas luego de la infección

aguda por SARS-CoV-2. De acuerdo con los criterios de elegibilidad, se seleccionaron 67 artículos. Los síntomas más frecuentes fueron: niebla mental, déficits mnésicos, atencionales, ejecutivos, neurolingüísticos y de velocidad de procesamiento, además de ansiedad y depresión. También se identificaron hipótesis etiológicas neuroanatómicas, funcionales, vasculares e inmunológicas. El NeuroCOVID implica diversos síntomas cognitivos, emocionales y comportamentales que afectan la calidad de vida y el funcionamiento de los pacientes, por lo que su detección temprana y un abordaje multidisciplinario son fundamentales. Se requiere de mayor investigación longitudinal para entender los mecanismos neurobiológicos y desarrollar protocolos y estrategias de rehabilitación neuropsicológica.

Beneficios y limitaciones del uso de la terapia de reminiscencia en pacientes con Alzheimer: Una revisión

Laura Castrillón Martínez, Antonia Pardo Montes, Ricardo Montoya Monsalve

Universidad CES

Introducción. La Enfermedad de Alzheimer (EA) representa aproximadamente el 60% de los casos globales de trastornos neurocognitivos, con una prevalencia del 5-6% en América Latina y el 75% de los casos de demencia en Colombia. El trabajo analiza la TR, una intervención no farmacológica introducida por Francis Galton en 1879, que permite recuperar, evocar y acceder a recuerdos autobiográficos previamente almacenados mediante el pensamiento consciente o inconsciente. **Objetivo.** Examinar la efectividad de la Terapia de Reminiscencia (TR) en población con enfermedad de Alzheimer (EA) desde un enfoque integral y multidisciplinario.

Metodología. La metodología incluyó una revisión exhaustiva de literatura utilizando bases de datos como ScienceDirect, Scopus y PubMed, seleccionando 54 artículos publicados en la última década. **Resultados.** La TR es más efectiva cuando se integra con terapias convencionales, incluyendo tratamientos farmacológicos,

estimulación cognitiva, actividad física y técnicas de relajación. El trabajo detalla la implementación recomendada de la TR (sesiones de 30-60 minutos, 1-2 veces por semana, durante 8-13 semanas), sus beneficios (mejoras en cognición, estado emocional, calidad de vida y síntomas conductuales), y sus limitaciones (revivir recuerdos traumáticos, frustración ante fallas de memoria, desajuste cultural y necesidad de personal capacitado). **Discusión.** Se explora la relación bidireccional entre memoria e identidad, destacando cómo los recuerdos semánticos son cruciales para mantener la autopercepción en pacientes con EA. Otras limitaciones en la investigación actual incluyen variaciones en la aplicación de la TR, falta de consenso sobre variables medidas, diversidad en instrumentos de medición y muestras poblacionales heterogéneas. **Conclusión.** La TR representa una valiosa intervención complementaria para pacientes con EA cuando se integra en un enfoque de tratamiento multidisciplinario.

ADHD en la edad avanzada: una entidad infradiagnosticada con implicaciones clínicas, neuropsicológicas y diferenciales

Iban Onandia-Hinchado

Psicología Amorebieta-Psicosasun, UEM, UNIR

Objetivos: El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (ADHD por sus siglas en inglés) es una condición neuroevolutiva que persiste en la vida adulta, pero su reconocimiento en mayores de 50 años sigue siendo excepcional. Se pretende analizar la evidencia actual sobre su perfil cognitivo, identifica retos diagnósticos en la práctica clínica y proponer líneas de desarrollo para mejorar el diagnóstico diferencial con el deterioro cognitivo asociado a la edad.

Método: Se analizan estudios publicados entre 2005–2024 con diagnóstico confirmado de ADHD en adultos ≥ 50 años y evaluación cognitiva diferenciada, examinándose dominios atencionales, memoria, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento. Se lleva a cabo un análisis de toda la información científica recabada, conjugándose con los principios de la práctica clínica en ADHD. **Resultados:** Los datos muestran alteraciones consistentes en atención y memoria episódica respecto a controles sanos, mientras que las funciones

ejecutivas presentan un patrón heterogéneo, llegando en algunos casos a igualar o superar el rendimiento de adultos jóvenes con ADHD. Este perfil “no clásico” dificulta la diferenciación con deterioro cognitivo leve y demencias, y explica la baja tasa de diagnóstico en este grupo etario. Además, no existen protocolos neuropsicológicos estandarizados para esta población, de forma que cabe elaborar consejos y recomendaciones de práctica clínica para llevar a cabo este tipo de evaluaciones y diagnósticos de forma correcta. **Conclusiones:** El ADHD en la vejez constituye una entidad infradiagnosticada con repercusiones funcionales y de salud mental. El reto actual no es únicamente describir su perfil cognitivo, sino generar criterios clínicos y baterías específicas aplicables, formar clínicos y diseñar guías para el diagnóstico diferencial. Se discutirán implicaciones clínicas, preguntas de investigación prioritarias y el potencial impacto en la neuropsicología de la vejez.

Prosody and Mu-Band Suppression in Spanish-Speaking Adults

Aris Yupanqui Peña-Ríos (1,2), Juan Carlos Caicedo-Mera (2), Joham Oliveros (2), Mariajosé Serna (2), Mauricio Aponte (2), Sandra Báez (1)

Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia

Objective: To test whether passive listening to affective vocal prosody elicits sensorimotor resonance indexed by EEG mu-band (8–13 Hz) suppression, and whether mu suppression differs across prosodic categories. **Methods:** Eighty healthy Spanish-speaking adults (40 men, 40 women; 25–60 years) listened to four non-semantic male-voice stimuli designed to approximate anger, joy, sadness, and calm through controlled combinations of pitch, intensity, and duration. EEG was recorded using the International 10–20 system (Fp1, Fp2, F3, F4, C3, C4, P3, P4). Data were filtered (0.5–40 Hz), artifact-corrected with ICA, and mu-band power was computed for baseline and stimulus epochs; suppression was indexed via log-transformed

power ratios. Repeated-measures ANOVAs tested effects of prosodic condition and electrode. **Results:** Mu-band suppression differed by electrode ($F=2.98$, $p=0.004$, $\eta^2p=0.038$), with stronger suppression at C4, C3, and F4 relative to frontopolar sites. Suppression did not vary across prosodic conditions ($F=0.617$, $p=0.604$, $\eta^2p=0.008$) and showed no electrode $\times$ condition interaction. **Conclusions:** Passive exposure to affective vocal cues engages sensorimotor-related cortical dynamics indexed by mu suppression, but this response is not category-specific for the tested prosodic combinations. Emotional prosody is therefore a tractable stimulus class for probing voice-driven socio-affective processing with EEG.

Error diagnóstico entre Trastorno del Espectro Autista y Trastorno del Desarrollo del Lenguaje: análisis neuropsicológico de dos casos

Santiago Marín - Balcázar, Elisa Naranjo y Jeniffer Márquez

UEPRIM. Unidad Educativa Particular Bilingüe “Principito & Marcel Laniado de Wind”
NeuroBrain. Neurodesarrollo y Neurorehabilitación.

El incremento en la prevalencia del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en los últimos años ha generado un debate clínico relevante en torno al posible sobrediagnóstico en población infantil, especialmente en casos donde las alteraciones primarias corresponden al dominio lingüístico. El presente trabajo tiene como objetivo analizar dos casos clínicos previamente diagnosticados con TEA que, tras una evaluación neuropsicológica y lingüística exhaustiva, evidenciaron un perfil compatible con Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL).

Se realizó un estudio descriptivo de casos mediante evaluación cognitiva estandarizada, análisis estructural del lenguaje (morfosintaxis, semántica y procesamiento auditivo-verbal), valoración de habilidades pragmáticas y revisión sistemática de los criterios diagnósticos establecidos en el DSM-5-TR. En ambos casos se identificaron

alteraciones significativas en la estructura formal del lenguaje, con dificultades en la organización sintáctica y el acceso léxico; sin embargo, se observó preservación de la reciprocidad socioemocional, la intención comunicativa y la capacidad de establecer vínculos sociales, aspectos nucleares para el diagnóstico diferencial con TEA. Los hallazgos sugieren que las dificultades comunicativas secundarias a déficits lingüísticos estructurales pueden interpretarse erróneamente como alteraciones sociales propias del espectro autista. Se discuten los factores clínicos que contribuyen al error diagnóstico y las implicaciones terapéuticas derivadas de una clasificación inadecuada. El estudio enfatiza la necesidad de evaluaciones multidisciplinarias rigurosas para una diferenciación precisa entre trastornos del neurodesarrollo con manifestaciones comunicativas superpuestas.

De lo Molecular a lo Cognitivo: El Rol de los Biomarcadores en la Neuropsicología Contemporánea

Sofía Hurtado Montoya¹, Juliana Calle Combariza², Ricardo Montoya Monsalve³

1. Estudiante de Maestría en Neuropsicología Clínica

2. Estudiante de Pregrado Psicología, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

3. Docente investigador de Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Objetivos: Analizar la utilidad de los biomarcadores como herramientas integradoras en la comprensión de las alteraciones neuropsicológicas en pacientes con secuelas de COVID-19 y enfermedades neurodegenerativas, explorando su relación con el deterioro cognitivo y su relevancia para la práctica clínica en neuropsicología. **Método:** Revisión bibliográfica en bases de datos como ScienceDirect, PubMed, Frontiers, Elsevier y Springer, utilizando palabras clave: citoquinas, COVID-19, neurocovid, cognición, PBMC, biomarcadores, enfermedades neurodegenerativas y rehabilitación neuropsicológica. Se incluyeron artículos publicados entre 2021 y 2024. **Resultados:** Se identificó una correlación significativa entre biomarcadores específicos y déficits cognitivos. En pacientes post-COVID-19, los marcadores IL-6, IL-10, TNF α , GFAP, MMP-9 y NfL se asociaron con alteraciones en memoria, atención y velocidad de procesamiento, relacionadas con

neuroinflamación y disrupción de la barrera hematoencefálica. En enfermedades neurodegenerativas, las variantes del gen APOE mostraron valor predictivo: APOE4 aumenta la vulnerabilidad, mientras que APOE3 confiere neuroprotección, incluso en presencia de mutaciones de alto riesgo como PSEN1-E280A.

Conclusiones: Los biomarcadores constituyen herramientas esenciales que complementan la evaluación neuropsicológica tradicional, permitiendo establecer perfiles más precisos mediante la integración de hallazgos conductuales, cognitivos e indicadores biológicos objetivos. Su incorporación facilita la planificación de intervenciones terapéuticas personalizadas basadas en mecanismos específicos de restauración, compensación y sustitución neuropsicológica. Se evidencia la necesidad de incluir el estudio de biomarcadores en los programas formativos de neuropsicología, alineándose con los avances contemporáneos de la disciplina.

Impacto de la Estimulación Transcraneal por Corriente Directa (tDCS) en Pacientes con Trastorno Afectivo Bipolar: Una Revisión Sistemática

Laura Sophia Ospina Rodríguez y Valentina Mosquera Caicedo
Juan Felipe Cardona, Lina María González

Grupo de Investigación en Neurociencias y Psicología Clínica - NIPSY

El trastorno afectivo bipolar (TAB) es una condición neuropsiquiátrica crónica, recurrente y altamente discapacitante, asociada a una de las tasas de suicidio más elevadas entre los trastornos mentales. Afecta significativamente el funcionamiento cognitivo y afectivo, así como la calidad de vida. Aunque el tratamiento farmacológico es el pilar terapéutico, su eficacia puede verse limitada por la resistencia clínica y los efectos adversos. En este contexto, la estimulación transcraneal por corriente directa (tDCS) ha emergido como una técnica de neuromodulación no invasiva, accesible y prometedora como intervención adyuvante. Esta revisión sistemática sintetiza la evidencia clínica disponible sobre la eficacia y utilidad terapéutica de la tDCS en personas con TAB, con énfasis en sus efectos sobre el rendimiento cognitivo, el afecto y la calidad de vida. Método: Siguiendo los lineamientos PRISMA, se realizó una

búsqueda en cuatro bases de datos electrónicas. Resultados: De los diecisiete estudios que cumplieron los criterios de elegibilidad, catorce reportaron mejoras significativas en al menos uno de los dominios evaluados. El efecto anti-depresivo fue el más investigado y mostró resultados más consistentes cuando la estimulación se aplicó sobre la corteza prefrontal dorsolateral (dlPFC) bilateral; sin embargo, los protocolos fueron metodológicamente heterogéneos. Conclusión: La tDCS podría constituir una intervención adyuvante prometedora para reducir los síntomas afectivos en el TAB, mientras que sus efectos sobre los dominios cognitivos y la calidad de vida son menos consistentes. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de ensayos controlados aleatorizados que integren técnicas de neuroimagen y neurofisiología para establecer con mayor claridad su eficacia clínica.

Resultados preliminares de una propuesta de rehabilitación cognitiva para pacientes con COVID prolongado

Carolina Hurtado Montoya¹, Diego Fernando Rojas Gualdrón², Ricardo Montoya Monsalve³, Julián Santiago Carvajal Castrillón³, Manuela Jiménez Cárdenas⁴, Mariana Campuzano Sierra⁵, Sofia Jiménez Esteban⁵, Sebastián Álvarez Zuluaga⁵, María Paula Alviar Ortiz⁵, Santiago Vasquez Builes⁶, Mariana Arroyave Bustamante⁷, Esteban Agudelo Quintero⁷, Juliana Vélez Arroyave⁷, Vanessa Julieth Pulgarín Muriel⁴, Sara Martínez Gallego⁴, Isabel Cristina Bolívar Lopera⁴, Astrid Andrea Arias Villa⁴, Carolina Lotero Lotero⁴, Catalina Ruiz⁴, Estefanía Botero Mesa⁴, Laura Marcela Cortés Yepes⁴, Stefanía Abaunza Torres⁴, Sofía Hurtado Montoya⁴, Valentina Cortés Barrios⁴, Yina Quique⁸, Igor Jerome Koralnik⁹

1. Grupo de Investigación en Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad CES, Medellín, Colombia
2. Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad CES, Medellín, Colombia
3. Grupo de Investigación Psicología Salud y Sociedad. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad CES, Medellín, Colombia
4. Maestría en Neuropsicología Clínica. Universidad CES, Medellín, Colombia
5. Médico(a) general. Universidad CES, Medellín, Colombia
6. Neurólogo clínico. Hospital Neurológico de Colombia.
7. Residente de especialidad en Neurología Clínica. Universidad CES, Medellín, Colombia
8. Speech and Hearing Sciences. University of New Mexico, EEUU
9. The Ken & Ruth Davee Department of Neurology. Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, IL, United States

Objetivo: Describir resultados preliminares de la adaptación de un protocolo de rehabilitación cognitiva en

personas con COVID prolongado. Método: Estudio cuantitativo con mediciones pre -pos sin grupo control

(n=16). La intervención está basada en 6 sesiones realizadas por estudiantes de maestría en Neuropsicología Clínica de la Universidad CES y divididas en 3 módulos: atención, función ejecutiva y memoria. Como variables de desenlace se encontraba la función cognitiva subjetiva medida por el PROMIS y mediciones cognitivas objetivas por el NIH Toolbox. La interpretación se realizó con puntuaciones T e intervalo de confianza al 95%. Resultados: Se encontró un promedio de edad de 43,5 (DE = 12.2), siendo 6 hombres y 10 mujeres. Además, 4 presentaban antecedente patológico personal neurológico y 9 con antecedente patológico familiar neurológico. Se observaron mejoras estadísticamente significativas en la mayoría de los desenlaces

evaluados; como la función cognitiva subjetiva (diferencia de medias: 12.50; IC 95%: 8.59–16.41 ; $p<0.0001$), seguida de velocidad de procesamiento (10.10; IC 95%: 2.89–17.31; $p=0.010$), atención y función ejecutiva (8.50; IC 95%: 3.26–13.74; $p=0.004$) y atención (8.00; IC 95%: 1.92–14.08; $p=0.013$). En cuanto a los síntomas psiquiátricos, se redujeron significativamente ansiedad (–11.80; IC 95%: –16.17 a –7.43; $p<0.0001$) y depresión (–8.10; IC 95%: –12.79 a –3.41; $p=0.002$). Por su parte, la fatiga también tuvo mejoría (–11.10; IC 95%: –17.75 a –4.45; $p=0.003$). Conclusiones: Estos resultados preliminares sugieren un impacto positivo del protocolo, a nivel cognitivo objetivo y subjetivo, en pacientes con COVID prolongado.

El perfil del neuropsicólogo ante los nuevos estándares de desempeño: Evaluación, intervención e investigación bajo el modelo SABI

Tatiana Manrique Zuluaga, Stewart Dueñas Trejos, Aura Rocío Ramírez

Tatiana Manrique Zuluaga y Stewart Dueñas Trejos: Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic
Aura Rocío Ramírez, Universidad de San Buenaventura

El perfil del neuropsicólogo en Colombia se presentó en el Catálogo de Cualificaciones del sector Salud (SABI) junto con el perfil del profesional en psicología y 4 campos más, bajo la estrategia del Marco Nacional de Cualificaciones, herramienta para organizar y clasificar aprendizajes. Como proyecto liderado por el Ministerio de Educación Nacional contó con el Colegio Colombiano de Psicólogos. La metodología empleada se basó en análisis de Cierre de Brechas de Capital Humano, utilizando mesas técnicas para traducir la complejidad de la práctica clínica en estándares de desempeño que respondan a realidades del sistema de salud y a necesidades actuales de la población. La competencia general definida se centra en evaluación, intervención e investigación del funcionamiento cerebral y su relación con la conducta bajo modelos teóricos sólidos y un enfoque interdisciplinario. Este perfil se operativiza

mediante competencias específicas que integran evaluación neuropsicológica centrada en la persona, implementación de intervenciones basadas en evidencia científica y participación en investigaciones básicas o aplicadas. Asimismo, el neuropsicólogo debe liderar proyectos de inclusión social, educativa y laboral, colaborando estratégicamente en equipos interdisciplinarios para fortalecer la prevención y el tratamiento integral del daño cerebral.

Desde Colpsic, se busca enfatizar que este marco no solo orienta e impacta en la actualización de los currículos universitarios hacia resultados de aprendizaje medibles, sino que fortalece la identidad y el ejercicio ético del neuropsicólogo y otros profesionales. Estandarizar estas dimensiones garantiza la idoneidad profesional, facilita la movilidad laboral y eleva la calidad del servicio, visibilizando y fortaleciendo el campo.

Potenciación del tratamiento en TDAH infantil mediante neuromodulación eléctrica (tDCS) en contextos de la vida real: protocolo para un ensayo controlado aleatorizado y evidencias multimodales (MODULA-T)

Vanessa Alexandra Villamarín Guerra¹ Federica Sassi¹ Azalea Reyes Aguilar² Diana Martella¹ Paloma Álvarez de Toledo Blandón³ Javier González Rosa⁴ José María Valderrama⁵ Fernando Barrios Álvarez² Marcos Madruga⁵ Joaquín A. Ibáñez Alfonso^{1*}

Universidad Loyola Andalucía

Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) is characterized by executive dysfunction, emotional dysregulation, and altered neural connectivity, with significant inter-individual variability in treatment response. While non-invasive neuromodulation shows promise, evidence from multimodal and ecologically valid designs remains scarce. This protocol describes the MODULA-T study, which evaluates the efficacy of combining transcranial direct current stimulation (tDCS) with conventional neuropsychological treatment in children with ADHD using a Real-World Evidence (RWE) approach. A sample of 80 children (aged 7–13) will participate in a randomized, double-blind, sham-controlled trial consisting of 20 sessions (1.5 mA, 20 min) delivered twice weekly. The experimental group will receive concurrent anodal stimulation over the left dorsolateral prefrontal cortex (F3) and cathodal

stimulation over the right ventromedial prefrontal cortex (Fp2). Multimodal assessments will be conducted pre- and post-intervention, integrating: (1) neuropsychological tasks for attention, executive functions, and emotional regulation; (2) resting-state EEG spectral power and event-related potentials (ERPs); (3) structural (DTI) and functional (rs-fMRI) neuroimaging of attentional networks (DAN, VAN, DMN); and (4) COMT Val158Met polymorphism as a potential moderator of therapeutic response. This study aims to clarify the neurobiological mechanisms underlying tDCS-induced plasticity and to identify multimodal biomarkers associated with treatment success. By bridging the gap between clinical efficacy and real-world effectiveness, MODULA-T aims to contribute to the development of personalized, precision-based interventions for ADHD and related neurodevelopmental disorders.

Guía introductoria a la neuropsicología forense

Valeria Gómez Hurtado, Mariana Mantilla, Ana Sofía Novoa, María Alejandra Aguirre, Leonardo Rodríguez Cely

Línea de Neuropsicología Forense del semillero Psico-crimen de la Pontificia Universidad Javeriana. Bajo la tutoría del Dr. Leonardo Rodríguez Cely

Este trabajo consiste en una guía introductoria a la neuropsicología forense, vista como un recurso académico que integra fundamentos teóricos, bases neurobiológicas y lineamientos de actuación pericial en el contexto jurídico. La propuesta responde a la necesidad de consolidar criterios conceptuales claros que orienten la formación y el ejercicio profesional en la intersección entre la neuropsicología y la psicología jurídica y forense. La guía se estructura en cuatro ejes. Primero, aborda los fundamentos históricos y conceptuales, desde los orígenes de la neuropsicología hasta la consolidación de la neuropsicología forense como disciplina especializada. Se delimita su objeto de estudio, diferenciándola de la psicología forense, e incorpora principios éticos y consideraciones normativas relevantes para el ejercicio profesional en Colombia. Segundo, desarrolla las

bases neuropsicológicas del comportamiento, con énfasis en la corteza prefrontal (inhibición, memoria de trabajo y flexibilidad cognitiva), el lóbulo temporal y el circuito posterior, incluyendo el papel del hipocampo, neurotransmisores, neuromoduladores y hormonas en la regulación cognitiva y conductual.

Tercero, examina áreas de aplicación en los ámbitos penal, civil y laboral, articulando las bases neuropsicológicas de trastornos seleccionados con su repercusión forense en imputabilidad, capacidad civil y valoración del daño. Finalmente, se presentan lineamientos de evaluación neuropsicológica forense, pruebas frecuentemente empleadas y una reflexión crítica sobre la incorporación de inteligencia artificial en procesos de valoración pericial, promoviendo rigor científico y responsabilidad ética.

Diferencias en el uso de marcos de referencia espacial en niños colombianos indígenas, rurales y urbanos

Melisa Alejandra Martínez Gallego, María Patricia Montañés Ríos

Universidad Nacional de Colombia

El desarrollo de la cognición espacial incluye el uso de marcos de referencia, definidos como sistemas de representación que proporcionan coordenadas en torno a las cuales se localizan los objetos. La cognición espacial tiene importantes implicaciones en la vida diaria, en el desarrollo de otras habilidades cognitivas y en el desempeño en áreas relacionadas con ciencia y tecnología. Este estudio buscó, por medio de un estudio descriptivo correlacional, explorar las diferencias en el uso de los marcos de referencia espacial en niños colombianos en un contexto rural (indígenas arhuacos y no indígenas) y en niños en un contexto urbano. La muestra está conformada por 151 niños (55 indígenas arhuacos, 48 rurales y 48 urbanos), entre 6 y 16 años, quienes realizaron tareas de cognición

espacial en las cuales se evaluaron los marcos de referencia relativo, intrínseco y absoluto. En los tres grupos se encontró el uso de los tres marcos de referencia; sin embargo, se evidencia un predominio del marco absoluto en los niños indígenas, inclusive desde edades tempranas, en contravía de lo esperado según los supuestos clásicos del desarrollo. Así como se encuentran diferencias en el uso de marcos de referencia espacial en poblaciones cultural, lingüística y geográficamente diversas, es posible pensar que estas mismas diferencias podrían ser evidentes en el desarrollo de otras habilidades cognitivas, lo que sería un aporte a las teorías del desarrollo cognitivo y a la construcción de estrategias pedagógicas implementadas con niños de diferentes contextos culturales.

Perfil Neuropsicológico del Trastorno de Identidad Disociativo: Una Revisión Sistemática bajo Metodología PRISMA

Juan Manuel Torres Sepúlveda, Diana Sofía Díaz Barrera, Leidy Tatiana Echeverría Cupa, Diego Alejandro Ascencio Meneses, Jair Andrés Martínez López, Laura Cristina Ojeda Sierra, Nicolás Porras Macías

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

Objetivo: Sistematizar la evidencia empírica actual sobre el funcionamiento cognitivo en adultos con Trastorno de Identidad Disociativo (TID), identificando patrones de rendimiento en las funciones de memoria, atención y funciones ejecutivas. Método: Se realizó una revisión sistemática bajo los lineamientos de la declaración PRISMA 2020. La búsqueda abarcó las bases de datos ScienceDirect, PubMed, EBSCO y Taylor & Francis (2015-2025), incluyendo una actualización final de búsqueda a febrero de 2026. Se seleccionaron estudios empíricos en adultos con diagnóstico confirmado de TID mediante criterios DSM/CIE que emplearan pruebas neuropsicológicas estandarizadas o tareas experimentales de rendimiento cognitivo.

Resultados: De 1640 registros iniciales, se incluyeron seis estudios de alta calidad metodológica. Los hallazgos identifican la amnesia disociativa como el marcador neuropsicológico central, evidenciando un

rendimiento cognitivo estado-dependiente; las capacidades de memoria de trabajo y episódica presentan variaciones significativas entre la identidad anfitriona y los estados alter. Por su parte, la atención y las funciones ejecutivas muestran resultados heterogéneos que fluctúan según el nivel de intrusión disociativa y la relevancia emocional de las tareas. Conclusiones: El perfil neuropsicológico del TID es complejo y requiere de un abordaje que trascienda las mediciones aisladas. Es imperativo desarrollar protocolos de evaluación con mayor validez clínica que incorporen baterías neuropsicológicas integrales y tareas de sesgo atencional. Finalmente, estos resultados aportan elementos técnicos para una praxis profesional ética y sensible al trauma, favoreciendo una comprensión más integral de la identidad fragmentada que permita orientar futuras estrategias de evaluación ajustadas a la complejidad neurocognitiva de este trastorno.

Evaluación y abordaje del Deterioro cognitivo inducido por quimioterapia

Nelse Francis Cartín

Caja Costarricense del Seguro social (CCSS)

El deterioro cognitivo inducido por quimioterapia, conocido coloquialmente como “quimiocerebro”, es un efecto secundario impactante y debilitante que experimenta un número significativo de sobrevivientes de cáncer, afectando su memoria, capacidad para realizar múltiples tareas y calidad de vida. A medida que la incidencia del cáncer aumenta a nivel mundial, comprender la compleja interacción entre los agentes quimioterapéuticos y sus repercusiones cognitivas se vuelve cada vez más vital. Los mecanismos clave implicados en el quimiocerebro incluyen la disrupción de la barrera hematoencefálica, la neuroinflamación y el estrés oxidativo como resultado de diversos tratamientos quimioterapéuticos. La quimioterapia podría provocar el desarrollo de efectos secundarios graves en el sistema nervioso central (SNC), como convulsiones, accidentes

cerebrovasculares, síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética (SIADH), pérdida de la visión, la audición y el gusto, así como deficiencias de memoria. Esto genera trastornos neurocognitivos y alteraciones cognitivas conocidos como “quimiocerebro”. El Grupo de Trabajo Internacional sobre Cognición y Cáncer (ICCTF) recomendó varias pruebas principales con puntos de corte clínicos sugeridos para determinar el deterioro cognitivo en pacientes con quimio cerebro. En los procesos de rehabilitación de Quimiocerebro, las mejoras más frecuentes se centran en la memoria, seguidas de las funciones ejecutivas y la velocidad de procesamiento. El presente trabajo se centrará en el análisis de procesos subyacentes del deterioro, las recomendaciones sobre evaluación y la rehabilitación cognitiva centrado en pacientes con quimiocerebro.

Análisis de trayectorias del desarrollo de la Cognición social en niños con trastorno del espectro autista

Lic. María Fernanda Mendoza Romero y Dr. Carlos Alberto Serrano Juárez

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación, la presencia de conductas restrictivas o repetitivas y retos en la interacción social. Dado su carácter espectral, las manifestaciones del TEA varían ampliamente entre individuos; sin embargo, uno de sus rasgos centrales es la dificultad para reconocer emociones y establecer reciprocidad social; en este marco, el estudio de la cognición social resulta fundamental. Objetivo: Analizar las trayectorias de desarrollo en tareas de cognición social en personas con TEA. Método: Participaron 19 niños en edad escolar con diagnóstico de TEA grado 1. Se les aplicaron las tareas de matrices y vocabulario del WISC IV para tener una

medida de su estado cognitivo y las tareas de cognición social del EFECES. Resultados: Los resultados arrojan que no hay interacción entre la edad y el desempeño en tareas de prosodia, reconocimiento de emociones, teoría de la mente y lenguaje pragmático. Conclusiones: Estos hallazgos podrían sugerir que el desarrollo de la cognición social presenta un curso atípico, dado que, desde una perspectiva evolutiva, se esperaría una relación positiva entre la edad y el rendimiento en este tipo de tareas. No obstante, la inclusión de un grupo control permitirá corroborar esta interpretación. Asimismo, un desarrollo atípico de la cognición social podría estar relacionado con las dificultades observadas en la reciprocidad social.

Pilotaje del Programa de Intervención en Funciones Ejecutivas “Unstuck and On Target” Adaptado a Población Colombiana

Paola Suárez-Pico, Adriana Martínez, Jonathan Safer

Pontificia Universidad Javeriana
University of Colorado Anschutz Medical Center

Unstuck and On Target (UOT) es una intervención escolar dirigida al fortalecimiento de la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas y el control conductual en niños de 7 a 11 años. El presente estudio tuvo como objetivo realizar el pilotaje del programa UOT, previamente adaptado culturalmente para su implementación en población infantil colombiana. Método: se realizó un estudio piloto mixto con diseño pre-post en 13 participantes entre 7 y 11 años, pertenecientes a una institución educativa de Bogotá, seleccionados por presentar dificultades en funciones ejecutivas. La implementación fue realizada por dos profesionales en Psicología. Se aplicaron instrumentos para evaluar funcionamiento ejecutivo antes y después de la intervención (BRIEF y Challenge Task). Paralelamente, se realizó un análisis cualitativo basado en: (1) observación del uso del lenguaje del programa y del reconocimiento de estrategias por parte de los niños, y (2)

percepciones de los profesionales sobre la utilidad del programa y posibles ajustes metodológicos. Resultados: no se observaron diferencias significativas en las medidas cuantitativas de funcionamiento ejecutivo ($p>0.05$). No obstante, cualitativamente se evidenció la incorporación del lenguaje del programa en el discurso de los niños y el reconocimiento de varias estrategias enseñadas. Los profesionales destacaron la utilidad práctica del programa, la claridad de los objetivos de las sesiones y la pertinencia de las actividades para la edad. También señalaron la necesidad de ajustar la duración de algunas sesiones y clarificar ciertas instrucciones. Conclusión: estos hallazgos sugieren que la versión adaptada del programa presenta condiciones favorables de implementación y aceptación en el contexto escolar colombiano. Futuras investigaciones deben enfocarse en la implementación del programa a mayor escala para evaluar eficacia clínica.

Diferencias en el procesamiento sensorial en adultos con autismo: una aproximación desde la neurodiversidad

Diana Carolina Gómez Blanco

Universidad de Investigación y Desarrollo - UDI

El trastorno del espectro autista (TEA), es sin duda una de las condiciones del neurodesarrollo que más auge ha tomado, no obstante las investigaciones se han centrado principalmente en población infanto-juvenil, esta investigación se centró en analizar las diferencias en el procesamiento sensorial entre adultos con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), otras neurodivergencias y población normotípica hispanohablante, utilizando una adaptación cultural del Sensory Perception Quotient (SPQ). Estudio piloto con muestra por conveniencia de 119 adultos hispanohablantes distribuidos en tres grupos: TEA (con diagnóstico profesional), neurodivergencias (ND) y control. Se administró la versión adaptada al español del SPQ en sus versiones de 92 y 35 ítems, junto con el Autism Spectrum Quotient (AQ-50) como medida de

validación. Se realizaron análisis de confiabilidad, validez discriminante, convergente y predictiva. El instrumento mostró excelente consistencia interna (SPQ-92 $\alpha=.911$; SPQ-35 $\alpha=.918$). El grupo TEA reportó significativamente mayor hipersensibilidad sensorial en todas las modalidades evaluadas (visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa) en comparación con los grupos ND y control. La correlación con el AQ fue significativa para la versión de 92 ítems. Las diferencias en el procesamiento sensorial constituyen una dimensión distintiva y clínicamente relevante de la experiencia autista en adultos. Estos hallazgos subrayan la necesidad de incorporar la evaluación sensorial en la práctica clínica con adultos hispanohablantes, reconociendo la sensorialidad no solo como criterio diagnóstico, sino como parte de la identidad neurodivergente.

Neuropsychological and Behavioral Interventions for ADHD in Latin America: A Systematic Review

Adriana Martínez-Martínez, Natalia Cadavid-Ruiz, Camila Alejandra Parra-Carranza, Valeria Gómez-Hurtado

Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá
Pontificia Universidad Javeriana sede Cali

Treatment evidence for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) in Latin America is limited and heterogeneous. We reviewed neuropsychological, behavioral, and combined interventions. This review was conducted in accordance with PRISMA 2020 guidelines. We searched PsycINFO, Web of Science, Cochrane, Scopus, SciELO, and PubMed (2000–2025), plus reference screening and Google Scholar. Eligible English/Spanish studies included participants with ADHD, an active behavioral and/or neuropsychological intervention, and a comparison condition. Because of heterogeneity, we synthesized findings narratively. Twelve studies (2009–2025) from Brazil, Chile, Colombia, and Mexico met inclusion criteria (7 neuropsychological, 3 behavioral, 2 combined). Neuropsychological interventions improved trained executive

functions, but transfer to ADHD symptoms and functional outcomes was modest and inconsistent. Behavioral interventions showed mixed effects, with more consistent benefits for oppositional symptoms, parenting, and quality of life than for core symptoms. Risk of bias was substantial, among four RCTs, three were high risk and one raised some concerns (RoB 2); among eight nonrandomized studies, five were serious and three critical (ROBINS-I). Future work should use adequately powered, preregistered trials that control concomitant treatments (including medication), use standardized functional outcomes with blinded/independent assessment where feasible, report fidelity and cultural adaptation, and include follow-up. These priorities support scalable, grounded ADHD services across the region.

Modelo de Clasificación de Imagen por Resonancia Magnética Funcional (fMRI) en Reposo de Pacientes con Esquizofrenia vs. Controles

Pedro Vélez Pardo¹ Ricardo Montoya Monsalve^{1,2} y Sofía Campuzano Cortina¹

1. Facultad Ciencias Sociales y Humanas. Universidad CES.

2. Integrante Grupo de Investigación “Psicología, Salud y Sociedad”. Facultad Ciencias Sociales y Humanas. Universidad CES.

Objetivo: Clasificar individuos con esquizofrenia versus controles sanos a partir de patrones de conectividad funcional en reposo mediante modelos de aprendizaje automático, e identificar las conexiones cerebrales más discriminativas para una interpretación neurofuncional trazable.

Método: Se analizaron datos fMRI en reposo del repositorio OpenNeuro (UCLA CNP, ds000030) en una muestra de 99 participantes (50 con esquizofrenia, 49 controles; edad media: 37 años; 72% hombres). Las series temporales se extrajeron con el atlas Schaefer-2018 (100 ROIs), aplicando regresión de confusores —incluyendo señal global— y calculando matrices de correlación de Pearson con transformación Fisher-z, lo que generó 4.950 características por sujeto. Se entrenó una regresión logística con penalización L2, escalado z-score y class_weight balanceado, optimizando el hiperparámetro C mediante validación cruzada

estratificada 5-fold. Random Forest se incluyó como comparador. Resultados: La regresión logística alcanzó AUC = 0,791, superior a Random Forest (AUC = 0,753). El umbral óptimo se determinó por el índice de Youden, evidenciando mayor sensibilidad que especificidad. Una prueba de permutaciones arrojó $p = 0,001$, confirmando la significancia estadística. Los mapas de conectividad revelaron un patrón mixto de desconectividad: hiperconectividades en circuitos límbico-DMN, intra-visual y límbico-visual, e hipoconectividades en interacciones dorsal-saliency, DMN-prefrontal interhemisférica y somato motora interhemisférica. Conclusiones: Los modelos lineales penalizados sobre conectomas de reposo ofrecen un desempeño clasificatorio moderado-significativo con interpretación neurofuncional coherente, posicionándose como herramientas prometedoras para el desarrollo de biomarcadores en esquizofrenia.

Niveles de envejecimiento activo y desempeño neuropsicológico en adultos mayores

Karen Micheel Acevedo Heredia, Sofía Yepes Skinner, Gabriela Fernanda Alfonso Salguero

Universidad Pedagógica y Tecnológica De Colombia

Introducción: el envejecimiento poblacional es un fenómeno global que plantea importantes desafíos sociales, económicos y sanitarios. En Colombia, la esperanza de vida ha alcanzado los 77,46 años (DANE, 2024), y se estima que para 2030 la proporción de personas mayores superará el 16% (Minsalud, 2021). Este panorama evidencia la necesidad de replantear las condiciones en las que se transita esta etapa vital. **Objetivo:** comparar el desempeño neuropsicológico en los niveles de envejecimiento activo en 140 adultos mayores de Tunja (60-80 años).

Metodología: diseño no experimental de corte transversal, con enfoque cuantitativo y de tipo descriptivo-comparativo. Se clasificó a los participantes mediante el Índice Individual de Envejecimiento Activo y se evaluó el desempeño neuropsicológico a través de un protocolo de evaluación con pruebas validadas

para cada dominio cognitivo. **Resultados:** desempeño neuropsicológico significativamente superior en el nivel alto de envejecimiento activo frente a los niveles medio y bajo. Se resaltan los resultados en las pruebas Dígito-Símbolo, Memoria de Wechsler-IV, Fluidez Semántica y Fonológica, Refranes y Figura compleja de Rey que reflejan funciones cognitivas relacionadas con procesos como atención y lenguaje los cuales son sensibles a los niveles de envejecimiento activo y aportan información importante sobre el desempeño neuropsicológico en esta etapa del ciclo vital. **Conclusiones:** variables como participación social, ocupación, seguridad económica, independencia, estado cognitivo, físico y mental destacan como factores claves para envejecer bien. Las funciones cognitivas son sensibles al envejecimiento activo, así que promoverlo contribuye a preservar la funcionalidad y el rendimiento cognitivo.

El rol de la ínsula en enfermedades psiquiátricas y neurológicas: un abordaje neuroanatómico y funcional

Ricardo Montoya Monsalve, Ana Isabel Muñoz, Valentina Carvajal

Objetivo: Describir la importancia de la Ínsula, sus áreas y redes desde la perspectiva anatómica, clínica y funcional. **Método:** Esta temática tiene como objetivo describir la importancia de la Ínsula, sus áreas y redes desde la perspectiva anatómica, clínica y funcional. Para cumplir con tal objetivo, se realizó una búsqueda en bases de datos como Dialnet, Google Académico, Repositorio Institucional (Universidad CES), ClinicaKey, Scielo, Redalyc, Scopus ;búsqueda realizada utilizando palabras claves como “Insula lobe”, “Lóbulo insular”, “Ínsula”, “Córteza insular”, “Insular lobe gyrus”, “Insula Cortex;” se seleccionaron un total de 48 artículos, donde los criterios de inclusión fueron: escritos en inglés o español, con una antigüedad de máximo 11 años. **Resultados:** Se evidencian alteraciones estructurales y funcionales de la Ínsula en múltiples trastornos tales

como la ansiedad, esquizofrenia, psicosis, depresión, bipolaridad, parkinson, epilepsia y adicciones;cambios que incluyen reducción de materia gris, hiperactivación y déficits en procesos emocionales, cognitivos y sensoriales (Gogolla, 2017;Namkung, Kim & Sawa, 2017;Latorre-Forcén et al., 2023;Leigh et al., 2014);se asocia con dificultades en cognición social, reconocimiento emocional, toma de decisiones y percepción del cuerpo. (Boucher, 2015;Lotze, 2024) .**Conclusiones:** La Ínsula es una zona fundamental para la integración emocional, cognitiva y social, su disfunción está implicada en una amplia variedad de trastornos neurológicos y psiquiátricos. Su rol en procesos como la percepción, la regulación emocional y la toma de decisiones la convierten en un elemento central para comprender la psicopatología y posibles intervenciones futuras.

Cognitive function and Stress: The mediating role of psychosocial determinants among Puerto Rican Older adults.

Delmarielinnette Castillo-Collazo, Aneudys Rosario-Rosario, Camille A. Rivera-Ramos, Kelly M. González-Torres, Melanie Portalatín-Ramos, Dr. Amílcar Matos-Moreno, Dr. Héctor M. Gómez-Martínez

This study examined whether depressive symptoms and social support mediate the association between perceived stress and cognitive functioning, with the purpose of informing interventions to preserve cognition in advanced age. A serial mediation model, using data from Wave 3 of the Puerto Rican Elderly: Health Conditions (PREHCO) study, estimated indirect pathways from perceived stress to cognitive functioning through depressive symptoms and social support, controlling for age and sex. Perceived stress, depressive symptoms, social support, and cognitive functioning were assessed using the Perceived Stress Scale (PSS), Geriatric Depression Scale (GDS), 6-item Lubben Social Network Scale (LSNS-6), and Telephone Interview for Cognitive Status (TICS-27), respectively. The sample included 617 community-dwelling adults aged

77 years and older (mean age = 83.99; 62.6% female). Higher perceived stress was associated with greater depressive symptoms ($\beta = 0.387, p < .001$), lower social support ($\beta = -0.274, p < .001$), and poorer cognitive functioning (total effect: $\beta = -0.168, p < .001$). In the full model, depressive symptoms ($\beta = -0.073, p < .001$) and social support ($\beta = 0.172, p < .001$) significantly predicted cognitive functioning. The direct effect of stress remained significant ($\beta = -0.072, p < .001$), indicating partial mediation. Approximately 56.5% of the total effect was explained by indirect pathways. Perceived stress contributes to poorer cognitive functioning partly through increased depressive symptoms and reduced social support, highlighting modifiable psychosocial targets for promoting cognitive resilience in Puerto Rican oldest-old adults.

Comorbilidad médica y rendimiento neuropsicológico en adultos mayores con deterioro cognitivo leve: un análisis de la carga patológica y farmacológica

Julián Alberto Galvis, Diana Tiga, Alexander Pabón

Universidad Autónoma de Bucaramanga
Universidad de Santander

Evaluar los determinantes del declive cognitivo es esencial para anticipar las trayectorias de salud funcional en el envejecimiento, dado que influyen en la autonomía y la calidad de vida del adulto mayor. Sin embargo, persiste un vacío sobre el impacto diferencial de la carga médica sistémica, entendida de forma separada como carga patológica y carga farmacológica, frente a variables sociodemográficas convencionales como la edad y la escolaridad. Aunque estudios previos han explorado patologías aisladas o usado tamizajes breves, no se ha establecido con claridad un patrón general entre distintos tipos de carga médica y dominios neuropsicológicos específicos. El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación entre la carga de comorbilidad médica y diversos dominios neuropsicológicos en adultos mayores con diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Se integraron medidas de atención, memoria, lenguaje, habilidades construccionales y funciones ejecutivas, junto con indicadores de carga patológica y farmacológica,

en una cohorte de 43 participantes. Se aplicaron modelos lineales generales ajustados por edad, escolaridad y sexo. Los resultados mostraron que la carga patológica no se asoció con el rendimiento neuropsicológico; únicamente se observó una tendencia en Stroop Color ($p = 0.0922$; R^2 ajustado = 0.0102). Por su parte, la carga farmacológica mostró tendencias de asociación negativa en denominación y control inhibitorio, observadas en Boston Naming ($p = 0.0516$; R^2 ajustado = 0.1097), Stroop Interferencia ($p = 0.0728$; R^2 ajustado = 0.1195) y Stroop Color ($p = 0.0766$; R^2 ajustado = 0.0181). La mayor capacidad explicativa de los modelos se observó en dominios relacionados con la velocidad de procesamiento, la cognición global, la memoria visual diferida y la memoria de trabajo. En conjunto, este patrón sugiere que la variabilidad del desempeño neuropsicológico estuvo más estrechamente vinculada a variables sociodemográficas, especialmente la edad y la escolaridad, que a la carga médica.

Efecto del Deterioro Cognitivo Leve y el tipo de tarea de elicitación del discurso oral en el nivel de abstracción considerando el funcionamiento ejecutivo como moderador”

Fernanda Narváez Fuentes

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Los Lagos

El Deterioro Cognitivo Leve (DCL) se caracteriza por un declive en uno o más dominios cognitivos (APA, 2014), sin comprometer la funcionalidad de las personas en las actividades diarias, lo que dificulta su diagnóstico temprano. Esta investigación se enfoca, precisamente, en las alteraciones semánticas del discurso oral, un posible marcador temprano del DCL (Bayles et al., 2020; Marra et al., 2021). La importancia del estudio de las alteraciones lingüísticas asociadas al DCL es que este se considera una fase prodrómica de la enfermedad de Alzheimer, la que presenta un aumento de su prevalencia debido al envejecimiento global de la población (Choreño-Parra et al., 2020). El objetivo general es determinar el efecto del DCL y el tipo de tarea de elicitación del discurso oral en el nivel de abstracción, considerando el funcionamiento

ejecutivo como moderador. En cuanto a los aspectos metodológico, esta investigación utiliza Leximetric, una herramienta de análisis cuantitativo del discurso oral, lo que representa una innovación en el ámbito de la lingüística clínica (Flor, 2024), y podría servir como complemento en los procesos diagnósticos, favoreciendo la identificación temprana de personas en riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Participan en la investigación 52 adultos mayores (26 con DCL y 26 sin DCL) a los cuales se les evalúa el funcionamiento ejecutivo y luego se le aplican distintas tareas de elicitación del discurso oral. Los resultados preliminares, al comparar el rendimiento entre grupos, evidencian la detección de variaciones del nivel de abstracción del discurso a través de las métricas de Leximetric.

Efecto de un Programa de Estimulación Neurocognitivo sobre la Cognición y Conducta Social

Leidy Johanna España Parrasí, Adriana Marcela Yara Duarte

Universidad Surcolombiana
Más Humanos IPS

El propósito de esta investigación fue determinar el efecto de un programa de estimulación neurocognitivo para la cognición social y conducta social (agresividad, acoso escolar) en escolares de educación básica primaria. Esta investigación fue de enfoque empírico analítico, de diseño cuasiexperimental pretest - posttest con grupo control, con evaluación del efecto de la variable independiente: programa de estimulación neurocognitivo, sobre las variables dependientes: cognición social (procesamiento emocional, teoría de la mente) y conducta social (agresividad y acoso escolar). La

muestra poblacional de la investigación fue compuesta por un total de 56 niños participantes (27 de grupo experimental y 29 de grupo control). Los resultados evidencian el efecto del programa de estimulación en los menores tanto en la cognición social (procesamiento emocional y teoría de la mente) como en la conducta social (agresividad y acoso escolar); aunque no son estadísticamente significativos en funciones ejecutivas son determinantes en el funcionamiento de la cognición social. Se discutieron los límites del estudio y las futuras líneas de investigación.

Evaluación e intervención psicológica en estudiantes universitarios con altas capacidades: relato de experiencia sobre el entrenamiento en habilidades sociales.

Aline Carolina Bassoli Barbosa, Vera Lúcia Messias Fialho Capellini, Ivanda Souza Silva Tudesco

UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

El estudio describe una experiencia de evaluación e intervención psicológica dirigida a estudiantes universitarios con altas capacidades/superdotación, basada en la Teoría de los Tres Anillos de Renzulli, que entiende la superdotación como la interacción entre capacidad superior a la media, creatividad e implicación con la tarea. Aunque estos individuos presentan alto potencial cognitivo, la literatura señala vulnerabilidades emocionales frecuentes, como ansiedad y síntomas depresivos, especialmente ante las demandas académicas y sociales. En este contexto, el desarrollo de habilidades sociales se considera un factor protector relevante, aún poco explorado en intervenciones estructuradas para esta población. El objetivo fue describir la experiencia de evaluación psicológica y la aplicación de un entrenamiento semiestructurado en habilidades sociales, analizando sus efectos sobre indicadores emocionales y repertorio social. Se trata de un relato de experiencia

con diseño cuasi-experimental, con la participación de cinco universitarios con altas capacidades ($CI \geq 130$) y quejas relacionadas con ansiedad, depresión o dificultades sociales. Las evaluaciones se realizaron en distintos momentos (pre, durante, postintervención y seguimiento), mediante instrumentos estandarizados. La intervención consistió en 13 sesiones grupales online, abordando comunicación interpersonal, asertividad, empatía, expresión emocional, manejo de críticas, organización académica y autorregulación emocional. Los resultados indicaron reducción de ansiedad, depresión y estrés, con mantenimiento de los efectos en el seguimiento, además de ampliación del repertorio social y mejora en la adaptación académica. Se concluye que integrar evaluación psicológica y entrenamiento en habilidades sociales favorece la salud mental y el desarrollo socioemocional en universitarios con altas capacidades.

Sintomatología emocional como predictor de síntomas cognitivos en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico

Andrés Camilo Delgado Universidad

Universidad de Manizales

Objetivo: Analizar la relación y el valor predictivo de la depresión y la ansiedad sobre los síntomas cognitivos en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Método: Estudio cuantitativo de diseño transversal con 105 pacientes diagnosticados con LES. Se evaluaron los síntomas depresivos mediante el Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II), la ansiedad con el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) y los síntomas cognitivos con la escala Cognitive Symptoms Inventory (CSI). Debido a la ausencia de normalidad, se emplearon correlaciones de Spearman y modelos de regresión lineal. Resultados: Se encontraron correlaciones positivas significativas entre depresión y ansiedad ($p = .758$, $p < .001$), así como entre depresión y síntomas

cognitivos ($p = .602$, $p < .001$) y entre ansiedad y síntomas cognitivos ($p = .649$, $p < .001$). El modelo de regresión fue significativo ($R^2 = .365$), explicando el 36.5% de la varianza en los síntomas cognitivos. Tanto la depresión ($\beta = .236$, $p = .026$) como la ansiedad ($\beta = .272$, $p = .001$) se identificaron como predictores significativos, siendo la ansiedad el predictor con mayor peso. No se evidenciaron problemas de colinealidad. Conclusiones: Los resultados sugieren que la sintomatología emocional desempeña un papel relevante en la disfunción cognitiva en pacientes con LES. En particular, la ansiedad emerge como un factor clave, lo que respalda un modelo biopsicosocial en la comprensión del funcionamiento cognitivo en esta población.

Maduración de redes neuronales funcionales: un estudio de fMRI en reposo desde la infancia a la adolescencia

Figuerola-Jiménez, M.D., Cañete-Massé, C., Gallardo-Moreno, G.B., Gudayol-Ferre, E., Perú-Cebollero, M., y Guàrdia-Olmos, J.

Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de los Valles en colaboración con la Universidad de Barcelona.

Objetivos: Caracterizar los cambios en la conectividad funcional (CF) cerebral asociados a la edad mediante la combinación de medidas de centralidad de grado (DC) y de análisis basados en semillas y aristas, y explorar la viabilidad de esta metodología en muestras pequeñas. **Método:** Estudio piloto con 26 participantes con desarrollo típico (6-18 años), divididos en un grupo de niños (6-9 años) y otro de adolescentes (14-18 años). Se utilizaron datos de fMRI en reposo para calcular la DC e identificar nodos clave (hubs), seguidos de análisis de CF para examinar la organización de redes como la Red de Modo Predeterminado (DMN), Visual (VN) y de

Atención Dorsal (DAN). **Resultados:** Se identificó un incremento de la DC con la edad en el giro angular derecho (DAN), el giro frontal superior derecho (FPN) y el precúneo izquierdo (VN). El grupo de mayor edad mostró una CF más robusta en la DMN, mientras que el grupo infantil exhibió una conectividad intra e inter-red más baja y difusa. **Conclusiones:** La combinación de DC con análisis de CF basados en ROI y aristas es una estrategia robusta para la investigación del neurodesarrollo. Los hallazgos sugieren una transición de una organización funcional local a una configuración más integrada y eficiente en la adultez.

Características sociodemográficas, clínicas y educativas de niños y niñas con Trastorno de espectro autista atendidos en el Servicio de Psicología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen

Marilia Lucía Baquerizo Sedano, Joe Bryan Lucero Chuquista, Karen Jeannette Kieffer Montoya

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Introducción: El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo cuya prevalencia se ha incrementado significativamente la última década. Describir el perfil sociodemográfico, clínico y educativo de la población infantil con TEA atendida en servicios públicos de salud es fundamental para optimizar el diagnóstico y la intervención. En Perú, la evidencia al respecto aún es limitada. **Objetivo:** Describir las características sociodemográficas, clínicas y educativas de los niños y niñas con TEA atendidos en el Servicio de Psicología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2024. **Metodología:** Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo basado en la revisión de historias clínicas electrónicas. Se analizaron datos de 420 niños y niñas, considerando edad, sexo, procedencia, composición familiar, escolaridad, diagnóstico CIE-10, comorbilidades, tratamientos y resultados de evaluaciones

estandarizadas de funcionamiento intelectual y conducta adaptativa. Se utilizaron estadísticas descriptivas. **Resultados:** El 84,8% fue de sexo masculino. El diagnóstico más registrado fue Autismo infantil (F84.0). La mayoría vivía con ambos padres, era paciente continuador y asistía a educación básica regular. Un tercio presentó comorbilidades, principalmente TDAH (70,9%). El 9% recibía tratamiento farmacológico y dos tercios recibían terapias no farmacológicas. Los niveles intelectuales y adaptativos se ubicaron mayormente en rangos bajos. **Conclusiones:** Los hallazgos revelan predominio del sexo masculino, alta frecuencia de comorbilidades y limitada cobertura de evaluaciones estandarizadas. Se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos diagnósticos, ampliar el acceso a evaluaciones interdisciplinarias y optimizar el uso de la historia clínica electrónica en el sistema de salud público peruano.

Impacto en los Trastornos del Neurodesarrollo en el Lenguaje en las Funciones Ejecutivas.

Henrich Joel Villanueva Vasquez

Universidad Científica del Sur y Universidad Cesar Vallejo

La neuropsicología del Lenguaje en el Perú tiene cada día más importancia para el desarrollo de evaluaciones e intervenciones psicoterapéuticas. Así el trastorno específico del lenguaje (TEL), se ha categorizado dentro de los trastornos de la comunicación, y se caracteriza por una deficiencia en el desarrollo del lenguaje (puede ser expresivo o receptivo-expresivo), demostrando un bajo rendimiento en las pruebas de aplicas, sus causas no son explicadas por retraso mental, por déficit sensorial o motor del habla, privación ambiental o daño neurológico evidente, el objetivo del estudio es analizar el grado de relación de la memoria auditiva inmediata y funciones ejecutivas en el niño con TEL. La metodología

es de diseño transversal descriptiva, correlacional. Con dos poblaciones de muestras, una de 23 niños (as) entre ocho años que asisten a un servicio de medicina física y rehabilitación quienes han recibido el diagnóstico de trastorno específico del lenguaje (TEL) y otra de 20 niños (as) que tengan escolaridad regular básica y con las mismas características de edad cronológica, sexo y condición socio-económica del grupo de estudio de la Provincia de Huaral, sus resultados y conclusiones fueron la relación entre las variables de estudio existe relación significativa pero negativa no -,184 de relación en el grupo de control y experimental entre niños de 8 años que presentan TEL y niños de 8 años que no presentan TEL.

Age-Stratified Normative Data for the Digital Finger Tapping Test in Puerto Rican Adults Using the CNS Tap Test App

Héctor M. Gómez-Martínez, Natalia V. Tristani-Silvestrini & Débora Arrufat Pérez

Universidad Carlos Albizu

Objectives: To develop normative data for a digital Finger Tapping Test in a Puerto Rican adult sample and examine the effects of age and education on performance using the CNS Tap Test app. **Method:** A quantitative, cross-sectional study was conducted with 163 Puerto Rican adults without self-reported neurological conditions. Participants completed a digital Finger Tapping Test administered through the CNS Tap Test app under standardized conditions. Mean scores were calculated separately for the dominant and non-dominant hands. Descriptive and comparative analyses were conducted across age cohorts (21-39, 40-54, and 55+) and educational levels. **Results:** Participants performed better with the dominant hand ($M = 51.89$, $SD = 10.96$) than with the non-dominant hand ($M =$

47.73 , $SD = 9.85$). Performance declined across age cohorts in both hands, with the lowest scores observed in the 55+ group. Significant age-related differences were found in tapping performance, $F(2, 160) = 7.81$, $p = .001$. Post hoc analyses showed a significant difference between the 21-39 and 55+ groups. Educational level was not significantly associated with performance and did not meaningfully alter the age-related pattern. **Conclusions:** Findings provide age-stratified normative data for a digital Finger Tapping Test in Puerto Rican adults. Age was the most relevant demographic variable for interpretation, whereas education showed limited utility. These results support the use of culturally specific norms for digital motor assessment in Puerto Rico.

Psychometric Findings of the Boston Naming Test-2 Under Remote Administration in Puerto Rican Adults: Implications for Teleneuropsychology

Héctor M. Gómez-Martínez, Loyra B. Rodríguez-Muñoz, Débora Arrufat-Pérez & Angélica Rodríguez-Cruz

Universidad Carlos Albizu

Objectives: To examine the psychometric performance of the Boston Naming Test-2 (BNT-2) under remote administration in a sample of Puerto Rican adults, with emphasis on score distribution, internal consistency, item performance, and associations with cognitive and emotional variables. **Method:** The sample included 90 Puerto Rican adults between 30 and 60 years of age ($M = 44.58$, $SD = 8.28$). Participants completed the BNT-2 through remote administration. Additional measures included the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), PHQ-8, and GAD-7. Analyses examined descriptive statistics, internal consistency, item difficulty, corrected item-total correlations, and associations between BNT-2 performance and age, education, cognitive performance, and emotional symptoms. **Results:** The mean BNT-2 total score was 48.17 ($SD = 3.40$), reflecting generally high naming performance. Internal

consistency was modest ($KR-20 = .58$). Item-level analyses revealed a marked ceiling effect, with 20 items answered correctly by all participants and 32 items showing accuracy rates of 95% or higher. Only a limited number of items demonstrated adequate corrected item-total correlations. No statistically significant associations were found between BNT-2 total score and age, education, MoCA, PHQ-8, or GAD-7 scores ($p > .05$). **Conclusions:** Remote administration of the BNT-2 appears feasible in Puerto Rican adults and yields interpretable score distributions; however, the observed ceiling effects and modest internal consistency suggest caution in psychometric interpretation. These findings highlight both the promise and the limitations of remote naming assessment and underscore the need for larger and more heterogeneous Puerto Rican samples to further inform tele neuropsychological practice.

Afectaciones neuropsicológicas por exposición a mercurio y arsénico en población infanto-juvenil colombiana en contextos de contaminación ambiental

César Argumedos De la Ossa

Corporación Universitaria del Caribe (CECAR)

La exposición a metales pesados como el mercurio y el arsénico representa un riesgo para el desarrollo neuropsicológico en población de niños y/o adolescentes. El objetivo de este estudio es explicar la asociación entre los niveles de exposición a estos contaminantes y el rendimiento en las habilidades neurocognitivas en una muestra infanto-juvenil colombiana de 70 participantes entre 9 y 16 años. Para la medición de los niveles de exposición se tomaron biomarcadores en cabello y sangre; en cuanto a las variables neuropsicológicas, se implementó un protocolo de 11 pruebas y se realizaron análisis comparativos, correlacionales y modelos de regresión lineal múltiple. Los resultados evidenciaron que el 57.1% de los participantes presentó niveles de exposición superiores a los valores de referencia internacionales, identificándose diferencias significativas

en el Test de Denominación de Boston con menor desempeño en el grupo expuesto, así como correlaciones negativas entre los niveles de mercurio y arsénico y funciones verbales y ejecutivas, del mismo modo, se encontró también que un aumento en los biomarcadores se asoció con una disminución del rendimiento neuropsicológico verbal y ejecutivo. En conjunto, estos primeros hallazgos sugieren que la exposición a mercurio y arsénico podría tener influencia en la manifestación sobre la afectación de procesos cognitivos clave en el contexto y edades de esta población. El presente estudio se constituye en un primer acercamiento de la participación del campo de la neuropsicología para aportar a la comprensión de los procesos de neurotoxicidad en Colombia, sobre todo en las zonas mayormente afectadas por la contaminación ambiental.

Procesamiento emocional percibido, funcionalidad familiar y conductas digitales de riesgo en adolescentes: una lectura desde la neuropsicología del neurodesarrollo

Msc Erika Ruperti¹, Phd. José Carlos Sánchez García², Msc. Adriana Sánchez³, Ps. Celine Díaz⁴

^{1,2}Universidad de Salamanca

^{1, 3, 4} Universidad Estatal de Milagro

La adolescencia representa una etapa de especial sensibilidad neuroevolutiva, caracterizada por la reorganización de circuitos implicados en el procesamiento emocional, la autorregulación conductual y la toma de decisiones en contextos de alta estimulación ambiental. En este marco, el uso intensivo de internet y del teléfono celular constituye un desafío relevante para la neuropsicología del neurodesarrollo, particularmente cuando interactúa con variables sociofamiliares y emocionales. El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre funcionalidad familiar, inteligencia emocional percibida, estilos de afrontamiento y conflictividad asociada al uso del celular e internet en adolescentes escolarizados. Se desarrolló un estudio cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional con una muestra de 1434 participantes. Se utilizaron medidas de funcionalidad familiar, inteligencia emocional percibida, afrontamiento y uso problemático de tecnologías. Los

resultados mostraron que la funcionalidad familiar presentó valor predictivo significativo sobre la inteligencia emocional. Asimismo, las dimensiones de claridad y reparación emocional se asociaron con respuestas de afrontamiento más adaptativas y con menor conflictividad vinculada al uso de tecnologías digitales. En contraste, la atención emocional aislada se relacionó con mayores niveles de conflicto, lo que sugiere una posible vulnerabilidad cuando la auto-percepción afectiva no se acompaña de recursos suficientes de modulación emocional. De forma complementaria, la lectura y la práctica deportiva se asociaron con mejores indicadores emocionales y menor conflictividad por el uso del celular. Se concluye que los factores emocionales y familiares constituyen marcadores clínicamente relevantes para la identificación temprana de conductas digitales de riesgo y para el diseño de estrategias preventivas con pertinencia neuropsicológica en población adolescente.

Funciones ejecutivas y Regulación emocional en un grupo de adultos con consumo dependiente y/o abusivo de spa, residentes en la fundación protegiendo vidas en el departamento de Antioquia

Cristian Camilo Yeneris; David Andrés Montoya Arenas; Cecilia María Díaz Soto

Cristian Camilo Yeneris: Universidad de San Buenaventura

David Andrés Montoya Arenas: Universidad Pontificia Bolivariana

Cecilia María Díaz Soto: Institución Universitaria de Envigado

El consumo dependiente y/o abusivo de sustancias psicoactivas (SPA) se asocia con alteraciones en procesos neurocognitivos y emocionales, particularmente en funciones ejecutivas y regulación emocional, que inciden en la conducta adictiva, la adherencia al tratamiento y el riesgo de recaída. No obstante, persisten vacíos en la comprensión de la interacción entre estos procesos en contextos clínicos latinoamericanos. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el funcionamiento ejecutivo y la regulación emocional en adultos en proceso de rehabilitación. Se desarrolló un estudio cuantitativo, no experimental, de corte transversal y alcance relacional, con una muestra de 26 adultos seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia en una institución del departamento de Antioquia. Se evaluaron las funciones ejecutivas mediante el INECO Frontal Screening y el

Montreal Cognitive Assessment (MoCA), y la regulación emocional mediante la Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS). Los resultados evidenciaron inicio temprano del consumo ($M = 13.96$ años), trayectoria prolongada ($M = 11.81$ años) y policonsumo, con predominio de THC y cocaína. Se observaron niveles moderados de desempeño ejecutivo y variabilidad en la regulación emocional. No se encontró una relación estadísticamente significativa entre el funcionamiento ejecutivo y la regulación emocional; sin embargo, los años de escolaridad se asociaron positivamente con el desempeño cognitivo ($p < .05$). Se concluye que, aunque no se confirma la relación esperada, la población presenta un perfil de vulnerabilidad neuropsicológica y emocional, lo que resalta la importancia de evaluaciones integrales y la necesidad de investigaciones con muestras más amplias y análisis específicos.

Modelo predictivo transversal del desempeño neurocognitivo en adultos con quejas cognitivas: impacto de experiencias traumáticas infantiles y mecanismos de mediación y moderación

Danicza Martínez Morales, David Andrés Montoya Arenas, Ana Milena Gaviria Gómez

Hospital Neurológico de Colombia, Universidad San Buenaventura, Fundación Universitaria María Cano

Introducción: El deterioro del rendimiento neurocognitivo es un motivo frecuente de consulta en atención primaria, especialmente en contextos como el colombiano, donde las experiencias traumáticas infantiles y la violencia sociopolítica representan factores de riesgo para el funcionamiento cognitivo en la adultez. **Objetivo:** Validar un modelo transversal de predicción con variables latentes para anticipar el desempeño neurocognitivo en adultos de mediana edad con quejas cognitivas, considerando la severidad del trauma infantil como variable predictora principal, así como el posible papel mediador del trauma reciente vinculado a violencia sociopolítica, la moderación de los síntomas psicopatológicos y el control de factores sociodemográficos y antecedentes médicos. **Metodología:** El estudio adoptó un diseño observacional, transversal y predictivo, utilizando Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)

para estimar la contribución relativa de los predictores. La muestra ($N = 300$) fue mayoritariamente femenina (65,3 %) y con bajo nivel educativo (62,3 %). Se modelaron constructos latentes reflectivos y formativos según criterios teóricos y psicométricos. **Resultados:** El modelo explicó el 42,1 % de la varianza del rendimiento neurocognitivo ($R^2 = 0.421$). La escolaridad fue el único predictor sociodemográfico significativo ($\beta = 0.293$, $p < .001$), y el trauma infantil emergió como el predictor negativo más robusto ($\beta = -0.306$, $p < .001$). Se evidenció mediación parcial del trauma reciente y moderación significativa de los síntomas psicopatológicos. **Conclusión:** Las experiencias traumáticas infantiles impactan negativamente el funcionamiento cognitivo en la adultez. El modelo validado ofrece una herramienta metodológicamente robusta para identificar trayectorias de riesgo en contextos de alta vulnerabilidad psicosocial.

Efecto de un entrenamiento cognitivo computarizado adaptado sobre las funciones ejecutivas y la sintomatología ansiosa en pacientes con trastorno neurocognitivo leve: resultados preliminares de un ensayo clínico aleatorizado

María Alexandra Cardona Tangarife, Daniel Alfredo Landínez Martínez

Universidad de Manizales, Doctorado en Psicología

El trastorno neurocognitivo leve (TNL) representa una condición de riesgo para el desarrollo de deterioro cognitivo mayor, en la que las alteraciones en funciones ejecutivas y la sintomatología ansiosa impactan significativamente la funcionalidad y la calidad de vida. En este contexto, las intervenciones basadas en entrenamiento cognitivo computarizado emergen como una alternativa prometedora. El objetivo del presente estudio es evaluar el efecto de un entrenamiento cognitivo computarizado adaptado sobre las funciones ejecutivas y la sintomatología ansiosa, en comparación con una intervención cognitiva estándar en pacientes con TNL. Se desarrolla un ensayo clínico aleatorizado con dos grupos: uno experimental con entrenamiento computarizado adaptado y un grupo control activo con intervención tradicional. La

intervención tiene una duración de 12 semanas, con evaluaciones pre y post mediante pruebas neuropsicológicas estandarizadas y el Inventario de Ansiedad de Beck. Se presentan resultados preliminares de un estudio piloto, en los cuales se observa una ligera mejora en la memoria de trabajo en ambos grupos, evaluada mediante tareas como dígitos, ordenamiento alfabético y Corsi. En contraste, no se evidencian cambios significativos en la flexibilidad cognitiva ni en el control inhibitorio, medidos a través de tareas como clasificación de cartas y Stroop. Estos hallazgos iniciales sugieren que, aunque el entrenamiento cognitivo puede impactar dominios específicos como la memoria de trabajo, sus efectos sobre otras funciones ejecutivas podrían requerir mayor intensidad, duración o adaptación de la intervención.

El trastorno específico de aprendizaje lector y narraciones infantiles

Carlos Vicente González García

Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), México

El trastorno específico del aprendizaje de la lectura TEAdL es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades en el procesamiento fonológico, con alteraciones en codificación, fluidez o en comprensión. La narración constituye una habilidad lingüística organizada a partir de estructuras secuenciales con inicio, desarrollo, clímax y coda. Se considera que estas estructuras se consolidan alrededor de los seis años y se enriquecen progresivamente a lo largo del desarrollo escolar. A pesar de la relevancia del lenguaje narrativo en los contextos educativos y comunicativos, existe escasa evidencia sobre la forma en que los niños con TEAdL construyen narraciones. La presente investigación busca contribuir a esta área de conocimiento mediante el análisis de narraciones producidas por niños con TEAdL, tanto en narraciones orales personales como en narraciones mediadas por un recurso audiovisual. Objetivo:

identificar patrones estructurales, temáticos y lingüísticos que permitan una comprensión más amplia de las habilidades comunicativas de los niños con TEAdL. Población: Estudio cualitativo basado en el análisis de 14 narraciones orales personales y 9 narraciones mediadas por video, producidas por niños de 4° diagnosticados con TEAdL. Resultados las narraciones personales se caracterizan por escasa descripción de eventos y personajes. En las narraciones mediadas por video hay dificultades en: inferencias sobre acciones, intenciones y emociones de los personajes; secuencia de los acontecimientos, cohesión y fluidez discursiva, uso restringido del vocabulario y deficiencias en recursos sintácticos y semánticos. Estos hallazgos sugieren que el TEAdL impacta no solo en la lectura, sino en competencias lingüísticas narrativas, con implicaciones relevantes para la intervención educativa y neuropsicológica.

Adaptación y Normalización del Test Barcelona 2 en Población Colombiana

Lorena García Ortiz

Universidad Autónoma de Barcelona

Introducción: En Colombia, la evaluación neuropsicológica, en su mayoría, se ha realizado con baremos de España o México, generando sesgos diagnósticos con impacto directo en la atención clínica. El Test Barcelona 2 (TB2) es uno de los instrumentos más utilizados por neuropsicólogos colombianos, pero carecía de datos normativos propios. Objetivos: Adaptar cultural y dialectalmente el TB2 al español colombiano y obtener datos normativos para población adulta entre 18 y 90 años en Colombia. Método: La adaptación siguió las directrices de la International Test Commission (2017): tres neuropsicólogos colombianos en ejercicio clínico revisaron independientemente los ítems, evaluando pertinencia semántica, léxica y formal; posteriormente fue revisado por el comité de dirección que incluía al autor de la prueba (Dr. Peña-Casanova), para garantizar que el instrumento no perdiera equivalencia. Para la normalización se evaluaron 315 adultos cognitivamente sanos, estratificados en 7 grupos por edad y escolaridad. Se realizaron análisis descriptivos, pruebas

de normalidad (Kolmogorov-Smirnov, diagramas Q-Q), correlaciones de Spearman (para encontrar correlaciones entre las variables de la prueba y las variables de edad y escolaridad) y comparaciones por sexo (U de Mann-Whitney). Finalmente, se establecieron los baremos para cada grupo normativo a partir de las frecuencias acumuladas de cada una de las 146 variables de la prueba. Resultados: Se generó el protocolo oficial versión Colombia del TB2, con ajustes dialectales documentados. Se construyeron tablas de percentiles y baremos colombianos para las 146 variables del instrumento en los 7 grupos normativos, evidenciando correlaciones significativas de edad y escolaridad sobre el rendimiento cognitivo. Conclusiones: Contar con estos baremos transforma la práctica neuropsicológica en Colombia: por primera vez, el clínico que utiliza en su práctica el TB2 puede interpretar el desempeño de su paciente en relación con su propio contexto cultural, educativo y lingüístico, reduciendo el riesgo de diagnósticos erróneos.

Desenlaces cognitivos postquirúrgicos en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal izquierdo

Manuela Jiménez-Cárdenas, Stefanía Abaunza-Tabares, Mariana Torres-Bustamante, Héctor Jaramillo-Betancura, Julián Carvajal-Castrillón

Fundación Instituto Neurológico De Colombia; Universidad CES, Facultad de Psicología, Grupo de Investigación Psicología, Salud y Sociedad

Introducción: La epilepsia del lóbulo temporal (ELT) representa una de las formas más comunes de epilepsia focal. La lobectomía temporal es una alternativa terapéutica efectiva, sin embargo, existe riesgo de deterioro cognitivo postquirúrgico debido a la dominancia hemisférica izquierda para funciones como lenguaje y memoria verbal. **Objetivo:** Evaluar los cambios en las funciones cognitivas de lenguaje, memoria y capacidad intelectual en pacientes con ELT izquierda sometidos a lobectomía temporal. **Métodos:** Estudio observacional, retrospectivo y longitudinal. Se incluyeron 38 pacientes adultos con ELT unilateral izquierda sometidos a lobectomía temporal entre 2014-2024. Se evaluaron variables clínicas y neuropsicológicas que incluyeron coeficiente intelectual (CI), índice verbal (IV), índice de razonamiento (IR), Test de Vocabulario de Boston (BNT) y pruebas de memoria mediante la

Escala de Memoria Wechsler I (WMS-I) y Escala de Memoria Wechsler III (WMS-III) pre y postquirúrgicos. Para comparar los puntajes de las pruebas se utilizó la prueba t de student para muestras pareadas o Wilcoxon. **Resultados:** No se observaron cambios significativos en CI (pre: 74.2 ± 13.3 , post: 74.7 ± 13.2 , $p=0.165$), IV (pre: $75[RIQ\ 67-83.5]$, post: $78[RIQ\ 66.3-84.8]$, $p=0.126$) ni IR (pre: 75.5 ± 11.3 , post: 75.4 ± 14.32 , $p=0.169$). Se encontró una disminución significativa en el puntaje BNT postquirúrgico (pre: 36.9 ± 8.3 , post: 34.5 ± 9.9 , $p=0.019$). La proporción de anomia aumentó de 51.9% a 60.5% ($p=0.073$). En las pruebas de memoria, aunque se observó una tendencia a la disminución en los puntajes de memoria verbal, estas no fueron significativas. **Conclusión:** La lobectomía temporal izquierda preserva la capacidad intelectual global pero puede impactar negativamente en la denominación.

Rehabilitación Neuropsicológica Basada en Evidencia en Enfermedades Neurológicas

Katherin Arenas Díaz, Andrea Rodríguez Díaz, Ricardo Montoya Monsalve

Universidad CES

Objetivos: Sintetizar la rehabilitación neuropsicológica basada en la evidencia como tratamiento en enfermedades neurológicas, evaluando las estrategias de intervención disponibles y su efectividad en diferentes condiciones como Traumatismo Encéfalo Craneano, Accidente Cerebro Vascular, Epilepsia, Neuroinfecciones, Esclerosis Múltiple y Trastorno Neurocognitivo Mayor. **Metodología:** Se realizó una búsqueda bibliográfica sistemática en bases de datos licenciadas (Dialnet, EBSCO, PubMed, Scielo, Scopus, entre otras) utilizando operadores booleanos y términos clave relacionados con rehabilitación neuropsicológica y enfermedades neurológicas. Se seleccionaron 58 artículos que cumplieron criterios de inclusión establecidos: publicaciones en inglés o español, de los últimos 10 años, con acceso desde bases indexadas. Se empleó la validez interna y niveles de evidencia según la Canadian Task Force on Preventive Health Care y Sackett para clasificar los estudios. **Resultados:** Las intervenciones neuropsicológicas mostraron

beneficios significativos en la restauración de funciones cognitivas como atención, memoria, funciones ejecutivas y lenguaje. Las metodologías variaron desde enfoques tradicionales (lápiz y papel) hasta intervenciones tecnológicas (realidad virtual, software especializado como RehaCom, CogniFit). Los mecanismos de restauración, sustitución y compensación demostraron efectividad variable según la patología. La rehabilitación asistida por tecnología mostró mayor capacidad predictiva y validez ecológica. **Conclusiones:** Existen diversas estrategias efectivas de rehabilitación neuropsicológica en daño cerebral adquirido. La individualización de los programas resulta fundamental, considerando características del paciente, tipo de lesión, reserva cognitiva y red de apoyo. La heterogeneidad neuropsicológica entre pacientes representa un desafío importante, evidenciando la necesidad de estudios con mayor rigurosidad metodológica y seguimientos a largo plazo para evaluar el impacto sostenido de las intervenciones.

Efecto del apoyo social y el estrés sobre la memoria episódica de adultos mayores sanos

Diana Carolina Echeverry-Bocanegra, Natalia Cadavid-Ruiz

Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Universidad Pontificia Bolivariana, Palmira

Introducción: El envejecimiento conlleva cambios biológicos y cognitivos, entre ellos el declive de la memoria episódica. Factores como el estrés y el apoyo social influyen en este proceso, aunque su relación conjunta no es concluyente. Este estudio examinó cómo el estrés percibido y el apoyo social afectan la memoria episódica en adultos mayores, considerando el aumento poblacional y la prevalencia de deterioro cognitivo. **Método:** Se realizó un estudio cuantitativo, explicativo y transversal con 63 adultos mayores (60–80 años). La memoria episódica se evaluó con la Figura Compleja de Rey-Osterrieth (FCRO) y el Hopkins Verbal Learning Test-Revised (HVLRT-R). El estrés se midió con la Escala de Estrés Percibido (EEP) y el apoyo social con el Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS). Se aplicaron análisis descriptivos, correlaciones de

Spearman y regresión lineal jerárquica, controlando variables sociodemográficas. **Resultados:** Más del 70% de los participantes presentó desempeño mnésico esperado. Se encontraron correlaciones débiles entre reconocimiento verbal y estrés (positiva), y entre reconocimiento y tamaño de red de apoyo (negativa). El modelo explicó el 27% de la varianza del reconocimiento verbal: mayor estrés se asoció con mejor desempeño, mientras que redes más amplias con menor rendimiento. Los hombres obtuvieron mejores resultados que las mujeres. **Conclusión:** El estrés y el apoyo social influyen de manera independiente en el reconocimiento verbal. El estrés moderado podría facilitar el procesamiento mnésico, mientras que una mayor red social no garantiza mejores resultados. Se sugieren estudios longitudinales.

Fenotipo Cognitivo en un Paciente Diagnosticado con Síndrome de Gertsman

Carlos Alberto Hurtado González, Juan Felipe Ayala Rico, Daniel Augusto Reyes, Sebastián Ospina Otalvaro, Karol Ponce, Julián Camilo Cedeño Buitrago, Paola Andrea Gutiérrez Lenis

Facultad de Medicina - Especialidad de Psiquiatría. Universidad Libre
Facultad de Medicina - Sección de Neurocirugía. Universidad del Valle

El síndrome de Gerstman (SG) es una patología neurológica de baja incidencia y prevalencia a nivel mundial, se caracteriza porque el paciente presenta síntomas como la agafia, alexia, agnosia digital, y desorientación alopsíquica. Se ha encontrado que los pacientes con este diagnóstico cursan con alteraciones emocionales como la ansiedad y la depresión, impactando en el empeoramiento de su calidad de vida (CDV) y en sus actividades básicas, instrumentales y avanzadas de la vida diaria (ABIVD). **Objetivo:** aplicar un protocolo de evaluación por neuropsicología clínica en un paciente con SG. con el propósito de identificar su fenotipo cognitivo, conductual y emocional. **Método y materiales:** paciente masculino de 63 años, estado civil casado, padre de 4 hijos, de escolaridad básica secundaria. Como patologías de base el paciente presenta HTA, prediabetes,

alteración en la tiroides e hiperlipidemia, lesión extensa cortico subcortical de origen isquémico subaguda crónica, de igual forma se identifican lesiones de aspectos vascular en la sustancia blanca con leve leucoaraiosis. La evaluación se realizó con la prueba NEUROPSI, Test del reloj, índice de Barthel y escala de Lawton y Brody. **Resultados:** El protocolo de evaluación por Neuropsicología Clínica identificó déficits cognitivos en tareas de atención (2), memoria inmediata (2) y funciones ejecutivas (semejanzas 2, cálculo 0, secuencias motoras 0), correlacionados clínica y funcionalmente con un SG que ha impacto en el empeoramiento de la CDV del paciente. **Conclusión:** Es importante generar técnicas de rehabilitación neurocognitiva que tengan como objetivo ralentizar el deterioro neurológico en el paciente, y así fortalecer las ABIVD del paciente.

VII Congreso Iberoamericano de Neuropsicología y V congreso Colombiano de Neuropsicología. Cartagena, Colombia. Septiembre 23 al 25 de 2026

SIMPOSIO

Más allá del diagnóstico: avances y desafíos en la evaluación neuropsicológica infantil y adolescente

Sebastian Jiménez Jiménez*, Diego Alejandro Calle Sandoval*, Paulina Guarín**, Juan David Britton**, Shadaris Usechi*, Juan David Garcés*, Víctor Javier Vega*, Dora Melfy Serna*, María José Londoño*, Valentina Sánchez*, Isabela Narvaez*, Laura Sofía Nieto*

*Pontificia Universidad Javeriana, Sede Cali, Colombia

**Corporación Universitaria Alexander Von Humboldt, Colombia

El presente simposio reúne 4 investigaciones recientes en evaluación neuropsicológica infantil y del desarrollo, con el objetivo de analizar la relación entre funciones cognitivas, contextos de vulnerabilidad y desafíos metodológicos en la práctica evaluativa. En primer lugar, se examinan las trayectorias del desarrollo de las funciones ejecutivas “frías” y “cálidas” entre los 6 y 18 años, evidenciando un patrón no lineal con periodos de aceleración y mesetas, asociado a procesos neurobiológicos de maduración cerebral. En segundo lugar, se presentan hallazgos sobre perfiles diferenciales del control inhibitorio en adolescentes en contextos de vulnerabilidad social, mostrando la naturaleza multidimensional de este constructo y la necesidad de evaluaciones que integren componentes ejecutivos y automáticos. Adicionalmente, se analiza la comprensión lectora infantil

como un proceso multicomponente, en el que la memoria verbal, el lenguaje y la inteligencia no verbal contribuyen de manera diferencial según la complejidad textual, con implicaciones directas en el rendimiento académico. Finalmente, se abordan los desafíos metodológicos en la evaluación del TDAH, particularmente en poblaciones juveniles, destacando el riesgo de sobrediagnóstico asociado al uso exclusivo de autorreportes y la necesidad de enfoques multimétodo que integren medidas objetivas del funcionamiento cognitivo. En conjunto, las ponencias subrayan la importancia de una evaluación neuropsicológica contextualizada, multicomponente y basada en evidencia, que permita comprender la variabilidad del desarrollo cognitivo y optimizar los procesos de diagnóstico e intervención en población infantil y adolescente.

Neurodesarrollo infantil en contextos diversos: evidencia desde factores socioculturales, diversidad étnica, educación inclusiva y condiciones clínicas en el Caribe colombiano.

Yanin Santoya-Montes, Karol Gutiérrez-Ruiz, Cherish Cantillo Ramos, Yuri Peña-Ramírez, Nicolasa Ramos-Julio

Yanin Santoya-Montes (Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia)

Karol Gutiérrez Ruiz (Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena, Colombia)

Cherish Cantillo Ramos (Universidad Javeriana de Cali, Colombia)

Yuri Peña-Ramírez (Universidad Simón Bolívar, Clínica general del Norte, Barranquilla, Colombia)

Nicolasa Ramos-Julio (Universidad Simón Bolívar, Clínica general del Norte, Barranquilla, Colombia)

El estudio del neurodesarrollo infantil en contextos diversos representa un desafío central para la neuropsicología contemporánea, especialmente en regiones caracterizadas por desigualdades sociales, diversidad cultural y condiciones clínicas complejas. Este simposio integra tres investigaciones empíricas desarrolladas en el Caribe colombiano que analizan el funcionamiento cognitivo y emocional en población pediátrica desde una perspectiva contextualizada. El primer estudio examina la relación entre variables sociodemográficas, actividades recreativas mediadas y no mediadas por tecnología, y el desarrollo cognitivo en la primera infancia, evidenciando el papel de la escolaridad materna y la lectura compartida como factores asociados al desempeño cognitivo. El segundo estudio analiza la relación entre funcionamiento neuropsicológico e inteligencia emocional en niños de una comunidad étnica

afrocolombiana, identificando un perfil globalmente promedio con debilidades específicas y asociaciones parciales entre dominios cognitivos y emocionales. El tercer estudio, mediante un enfoque clínico de casos, describe dificultades en la regulación atencional en niños con hemofilia, aun en presencia de un funcionamiento cognitivo general conservado.

En conjunto, los hallazgos sugieren que el neurodesarrollo infantil presenta perfiles diferenciados en función de factores socioculturales, contextuales y biomédicos, más allá de indicadores globales de funcionamiento. Este simposio propone una aproximación integradora que resalta la importancia de desarrollar evaluaciones e intervenciones neuropsicológicas culturalmente pertinentes y clínicamente informadas, contribuyendo al avance de una neuropsicología del desarrollo más equitativa y sensible a la diversidad en Colombia.

Estudio 1:

Más allá de las pantallas: Factores sociocognitivos que predicen el desarrollo en la primera infancia

Karol Gutiérrez Ruiz

(Universidad Tecnológica de Bolívar, Cartagena, Colombia)

Objetivo: Examinar la asociación entre variables sociodemográficas, actividades recreativas mediadas y no mediadas por tecnología, y el desarrollo cognitivo en la primera infancia. Método: Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, de corte transversal. Participaron 69 niños y niñas entre 5 y 34 meses ($M = 17,7$; $DT = 6,2$), usuarios de Centros de Desarrollo Infantil y escuelas infantiles de Cartagena (Colombia), junto con sus cuidadores principales. La mayoría de la muestra pertenecía a contextos socioeconómicamente desfavorecidos. Se recolectó información sociodemográfica y

sobre la frecuencia de actividades recreativas (lectura compartida, juego al aire libre, exposición a televisión, uso de teléfonos inteligentes y aplicaciones educativas) mediante un cuestionario estructurado. El desarrollo cognitivo fue evaluado con la subárea Cognitiva del Inventario de Desarrollo Battelle. Se realizaron correlaciones de Spearman y regresión lineal múltiple. Resultados: El nivel educativo materno y la frecuencia de lectura compartida se asociaron significativamente con el desempeño cognitivo, explicando conjuntamente el 36,8 % de la varianza ($R^2 = .368$; $f^2 = .58$; $p < .001$). No se

observaron asociaciones estadísticamente significativas entre el uso de pantallas y el desarrollo cognitivo. Conclusiones: Los hallazgos sugieren que la escolaridad materna y las prácticas de lectura temprana se relacionan con el desarrollo cognitivo en la muestra estudiada. Estos resultados aportan evidencia para orientar

estrategias de promoción del desarrollo infantil, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.

Palabras clave: Desarrollo infantil, Actividades recreativas, Lectura compartida, Factores socioeducativos, Primera infancia

Estudio 2:

Funcionamiento neuropsicológico e inteligencia emocional en una comunidad étnica del departamento de Bolívar, Colombia.

Cherish Cantillo Ramos

(Universidad Javeriana de Cali, Colombia)

Objetivo: Analizar la relación entre el funcionamiento neuropsicológico y la inteligencia emocional en niños y niñas pertenecientes a una comunidad étnica del departamento de Bolívar, Colombia. Método: Se desarrolló un estudio cuantitativo, no experimental, de alcance descriptivo-correlacional. La muestra estuvo conformada por 41 niños y niñas de entre 7 y 11 años ($M = 9.73$, $DE = 1.61$). Se administraron la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI-2) y el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn para niños y adolescentes. El análisis de los datos incluyó estadística descriptiva y correlacional, considerando variables sociodemográficas y contextuales relevantes. Resultados: Los participantes mostraron un perfil neuropsicológico predominantemente promedio en la mayoría de las subpruebas de la ENI-2, aunque se observaron desempeños bajos en diez de ellas y rendimientos altos en áreas específicas, como percepción visual. En inteligencia emocional, la puntuación global y sus dimensiones se ubicaron, en términos generales, dentro del rango promedio. Se identificaron

asociaciones significativas entre algunas variables neuropsicológicas y dimensiones de inteligencia emocional, varias de ellas en dirección negativa, particularmente en tareas de percepción auditiva, habilidades visoespaciales y rendimiento aritmético. Conclusiones: Los hallazgos sugieren un perfil cognitivo y de inteligencia emocional predominantemente promedio, aunque con debilidades específicas en algunas funciones neuropsicológicas. Los resultados deben interpretarse con cautela debido al carácter correlacional del estudio y al tamaño de la muestra. Aun así, aportan una primera caracterización empírica del funcionamiento neuropsicológico y emocional de niños y niñas de esta comunidad étnica, con implicaciones para futuras investigaciones y para el desarrollo de estrategias de evaluación e intervención culturalmente pertinentes.

Palabras clave: Funcionamiento neuropsicológico, inteligencia emocional, diversidad étnica y racial, afrocolombianos, niños.

Estudio 3:

Funcionamiento atencional en enfermedades huérfanas: evidencia en hemofilia pediátrica.

Yuri Peña-Ramírez¹, Nicolasa Ramos-Julio¹ y Yanin Santoya-Montes²

¹ Universidad Simón Bolívar, Clínica general del norte, Barranquilla, Colombia

² Universidad Simón Bolívar, Barranquilla, Colombia.

Objetivo: Analizar el funcionamiento atencional en pacientes pediátricos con hemofilia, considerando su posible vulnerabilidad a alteraciones cognitivas asociadas a la enfermedad. Método: Se llevó a cabo un estudio de tipo clínico mediante análisis de casos. A partir de una muestra inicial de ocho pacientes con hemofilia, se seleccionaron

dos casos correspondientes a varones de 11 años, con el fin de facilitar la comparación bajo condiciones de desarrollo similares. Se realizó una evaluación neuropsicológica orientada a explorar distintos dominios cognitivos, con énfasis en los procesos atencionales. Resultados: En ambos casos se evidenció un funcionamiento cognitivo

global acorde con la edad, con adecuado desempeño en comprensión y lenguaje. No obstante, se identificaron dificultades en la regulación de la atención, especialmente en el mantenimiento de la tarea y la tendencia a la distracción. Asimismo, se observaron manifestaciones conductuales asociadas a impulsividad y a una ejecución acelerada de las actividades, lo que impactó negativamente en la calidad del desempeño. Conclusiones: Los hallazgos sugieren que, incluso en presencia de

un funcionamiento cognitivo global conservado, los procesos atencionales pueden constituir un dominio vulnerable en niños con hemofilia. Estos resultados destacan la importancia de incorporar la evaluación neuropsicológica, particularmente de la atención, dentro del abordaje clínico integral de esta población.

Palabras clave: Hemofilia; atención; neuropsicología; enfermedades huérfanas; población pediátrica

Evaluación neuropsicológica digital para población hispanohablante: Casos clínicos y aplicaciones en la práctica profesional

María Clara Aguilar Dávila, Yadir Camilo Buritica Daza, María González Nosti, Juan Carlos Arango Lasprilla

Departamento de Psicología. Universidad Cooperativa de Colombia. Medellín, Colombia.

Facultad de Ciencias de la Rehabilitación. Universidad Andrés Bello. Santiago, Chile

Departamento de Psicología. Universidad de Oviedo. Oviedo España

Departamento de Biología Celular e Histología. Universidad del País Vasco. Leioa, España

Resumen: La evaluación neuropsicológica ha experimentado avances significativos con la incorporación de herramientas digitales; sin embargo, en el ámbito hispanohablante persiste la necesidad de instrumentos desarrollados originalmente en español, con adecuada validez cultural y rigor científico. ENCO-E surge como la primera batería de evaluación neuropsicológica completamente online diseñada desde sus fundamentos para población hispanohablante, superando las limitaciones de las adaptaciones de pruebas tradicionales. Objetivos: Presentar las características principales de ENCO-E, destacando su capacidad para evaluar múltiples dominios cognitivos de forma objetiva, su base científica y su aplicabilidad tanto en contextos presenciales como de teleneuropsicología. Método: ENCO-E evalúa procesos atencionales, memoria y aprendizaje, lenguaje, funciones visoespaciales, praxias, percepción, velocidad de procesamiento y validez de esfuerzo. La batería ha sido desarrollada bajo estándares científicos rigurosos, incluyendo aprobación por comité de

ética, estudios piloto y entrenamiento de evaluadores. Los baremos fueron construidos mediante análisis estadísticos avanzados en población infantil y adulta de Latinoamérica y España, controlando variables relevantes. La plataforma digital permite una administración estandarizada, registro preciso de tiempos de reacción en milisegundos y generación automática de resultados. Resultados: La implementación de ENCO-E permite obtener datos objetivos de alta precisión, reducir la variabilidad asociada al evaluador, optimizar los tiempos de evaluación y facilitar la interpretación clínica mediante reportes automatizados, además de ampliar el acceso a la evaluación a través de la teleneuropsicología. Conclusiones: ENCO-E representa un avance significativo en la evaluación neuropsicológica al integrar tecnología y rigor científico en una herramienta diseñada para población hispanohablante, posicionándose como una alternativa innovadora, accesible y confiable tanto para la práctica clínica como para la investigación.

Memoria y aprendizaje a lo largo del desarrollo: evaluación neuropsicológica y determinantes ambientales desde la infancia hasta la adolescencia

Adriana M. Martínez Martínez, Diego Armando León-Rodríguez, Pablo Reyes

Profesor (a) Pontificia Universidad Javeriana

Resumen: La memoria constituye uno de los procesos cognitivos centrales para el aprendizaje, la adaptación y la participación social a lo largo del desarrollo. Su estudio requiere integrar perspectivas provenientes de la neuropsicología del desarrollo, la evaluación cognitiva, la neurociencia cognitiva y el análisis de los determinantes ambientales que moldean sus trayectorias desde la infancia hasta la adolescencia. En conjunto, las ponencias responden a la pregunta central de cómo se desarrolla la memoria desde la infancia hasta la adolescencia y cuáles factores neurocognitivos y contextuales explican sus trayectorias a lo largo del curso de la vida. El simposio se compone de tres ponencias empíricas y una presentación

integradora final. La primera examina las propiedades psicométricas preliminares de una tarea narrativa diseñada para evaluar aprendizaje y consolidación semántica mediante curvas de aprendizaje y olvido. La segunda analiza el papel de factores ambientales (nutrición, contexto educativo y características familiares) en las trayectorias del desarrollo mnésico infantil. La tercera aborda la relación entre memoria de trabajo y procesamiento sintáctico en adolescentes escolarizados. Finalmente, la cuarta presentación integra estos hallazgos dentro de una perspectiva del curso de la vida, proponiendo un modelo neuropsicológico que articula maduración neurocognitiva, aprendizaje experiencial y condiciones ambientales.

■ Ponencia 1

Propiedades psicométricas preliminares de la prueba iter-SEIN para la evaluación del aprendizaje semántico en niños de 4 a 10 años: análisis de curvas de aprendizaje y olvido

Adriana Martínez, Diego León Rodríguez

Objetivo: Evaluar las propiedades psicométricas preliminares de la prueba iter-SEIN como instrumento para medir aprendizaje y consolidación de información semántica en población infantil colombiana y describir la trayectoria del aprendizaje y el olvido entre los 4 y 10 años. **Método:** Estudio instrumental con diseño transversal en niños de 4 a 10 años provenientes de instituciones educativas urbanas y rurales. La confiabilidad del puntaje total se estimó mediante modelos lineales mixtos y cálculo del coeficiente de correlación intraclase (ICC). La evidencia preliminar

de validez se evaluó analizando la relación entre edad y desempeño. **Resultados:** Se encontraron incrementos sistemáticos en rendimiento asociados a la edad y trayectorias diferenciadas en aprendizaje y retención. El modelo mixto mostró proporción sustancial de varianza atribuible a diferencias individuales. **Conclusiones:** Se encuentran evidencias preliminares de confiabilidad y validez basada en el desarrollo para la prueba iter-SEIN, destacando su potencial como herramienta dinámica de evaluación de la memoria en niños.

Ponencia 2

Factores ambientales asociados al desarrollo de la memoria en niños de 4 a 10 años: evidencia del proyecto iter-SEIN

Diego León Rodríguez, Adriana Martínez

Objetivo: Analizar la relación entre variables ambientales y el desarrollo neuropsicológico de la memoria semántica durante la niñez. **Método:** Modelos de regresión multivariada para examinar asociaciones entre variables ambientales y trayectorias del desarrollo de la memoria. **Resultados:** Asociaciones consistentes entre desempeño

lingüístico, rutinas educativas estructuradas y mejor desempeño en aprendizaje semántico. Nivel educativo parental y oportunidades tempranas mostraron asociaciones con diferencias en pendiente y retención. **Conclusiones:** El desarrollo de la memoria refleja la interacción entre maduración cognitiva y contexto ambiental.

Ponencia 3

Funciones ejecutivas y lectura en adolescentes: el rol de la memoria de trabajo en el procesamiento sintáctico

Pablo Reyes

Objetivo: Analizar la relación entre funciones ejecutivas y competencias lectoras en adolescentes escolarizados. **Método:** Estudio observacional transversal con 136 estudiantes de 9°, 10° y 11° grado de cuatro colegios bogotanos (51,1% mujeres; $M = 15,9$ años). Las competencias lectoras se evaluaron con la batería PROLEC-SE-R en sus niveles léxico, sintáctico y semántico. Las funciones ejecutivas se midieron con tres tareas computarizadas implementadas en PsychoPy: el SART (atención sostenida y control inhibitorio), el Digit Span Test —DST— (memoria de trabajo) y las Matrices Progresivas de Raven (abstracción no verbal). Se realizaron correlaciones de Pearson tras verificar normalidad (Shapiro-Wilk), homocedasticidad (Breusch-Pagan) y linealidad. **Resultados:** Las correlaciones más consistentes involucraron la memoria de trabajo (DST): la amplitud de memoria y el número de aciertos se correlacionaron significativamente con el procesamiento de Estructuras Gramaticales ($r = .24$, $p < .05$) y con el Juicio de Gramaticalidad ($r = .23-.24$, $p < .05$), en ambos casos en la dirección esperada (mayor

amplitud, mayor precisión sintáctica). Estas asociaciones fueron específicas para el nivel sintáctico y no se extendieron a los componentes semánticos, lo que sugiere un rol diferenciado de la memoria de trabajo en el mantenimiento y manipulación de información gramatical compleja. De manera complementaria, la atención sostenida (SART) mostró asociaciones más amplias, abarcando también comprensión narrativa ($r = .35$) y procesamiento léxico, mientras que la abstracción no verbal (Raven) se asoció principalmente con comprensión expositiva. **Conclusiones:** La memoria de trabajo contribuye de forma selectiva al procesamiento sintáctico en adolescentes colombianos, apoyando la capacidad para mantener activas estructuras gramaticales complejas durante la lectura. Estos hallazgos, consistentes con evidencia previa en Argentina y Panamá, extienden la validez de este vínculo al contexto latinoamericano y sugieren que intervenciones orientadas a fortalecer la memoria de trabajo podrían tener un impacto directo en la competencia lectora durante la educación secundaria.

Ponencia 4

La memoria desde una perspectiva del curso de la vida: integración neuropsicológica entre desarrollo, contexto y evaluación

Adriana Martínez, Diego León-Rodríguez y Pablo Reyes

Objetivo: Integrar los hallazgos dentro de un marco del curso de la vida que articule desarrollo cognitivo, evaluación neuropsicológica y determinantes ambientales. **Conclusiones:** Una perspectiva del

curso de la vida permite orientar políticas públicas, prácticas clínicas y programas de intervención temprana dirigidos al fortalecimiento de la memoria y el aprendizaje.

Del estrés al cerebro y la conducta: un enfoque neuropsicológico y multimétodo del burnout parental y el desarrollo infantil

María Josefina Escobar, Carolina Panesso, Francisca Perez

Universidad Adolfo Ibáñez, Escuela de Psicología
Universidad de Chile, Facultad de Psicología

Resumen: Este simposio presenta evidencia empírica que integra niveles conductuales, neuropsicológicos y neurobiológicos para comprender el impacto del burnout parental en el desarrollo infantil. Desde un enfoque multimétodo y diádico, se examinan mecanismos que van desde funciones ejecutivas hasta biomarcadores de estrés crónico y sincronía neural interpersonal. El primer estudio analiza longitudinalmente el funcionamiento ejecutivo infantil, evaluado mediante el Behavior Rating Inventory of Executive Function–Preschool Version (BRIEF-P) y el Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF), en función de los niveles de burnout parental (alto, en riesgo y bajo). El segundo estudio examina la asociación entre burnout parental y cortisol capilar en madres e hijos/as, junto con su relación con funciones ejecutivas y problemas conductuales. El tercer

estudio explora la coordinación coparental y su relación con el desarrollo infantil y la sincronía inter-cerebral mediante electroencefalografía (EEG) en contextos de interacción familiar. Los resultados convergen en mostrar que el burnout parental se asocia con alteraciones persistentes en el funcionamiento ejecutivo infantil, mayores niveles de estrés fisiológico en díadas madre-hijo y dificultades en el ajuste socioemocional. Además, emergen procesos relacionales y neurofisiológicos, como la sincronía cerebral entre cuidadores, como posibles mecanismos de co-regulación. En conjunto, este simposio propone una comprensión neuropsicológica integradora del desarrollo infantil en contextos de estrés parental, destacando la importancia de intervenciones tempranas que consideren simultáneamente factores cognitivos, biológicos y relacionales.

Trabajo 1:

María Josefina Escobar, Carolina Panesso

Objetivo: Examinar longitudinalmente la asociación entre el burnout parental y el funcionamiento ejecutivo infantil, utilizando reportes parentales en tres momentos de medición. **Método:** Participaron madres y padres de niños/as en edad preescolar, clasificados en tres grupos según sus niveles de burnout parental: con burnout, en riesgo y sin burnout. El funcionamiento ejecutivo de los niños/as fue evaluado mediante los cuestionarios BRIEF-P y BRIEF, completados por los cuidadores en distintos momentos del estudio. Se realizaron análisis longitudinales para comparar trayectorias de cambio entre los grupos. **Resultados:** Los resultados indican diferencias significativas en el funcionamiento ejecutivo infantil según el nivel de burnout parental. Específicamente, los hijos/as de padres y madres con burnout mostraron

mayores dificultades en regulación emocional, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva en comparación con los otros grupos. Estas diferencias se mantuvieron a lo largo del tiempo, sugiriendo una trayectoria más desfavorable en el desarrollo ejecutivo. El grupo en riesgo presentó resultados intermedios, evidenciando un patrón gradiente consistente con los niveles de burnout parental. **Conclusiones:** Los hallazgos sugieren que el burnout parental se asocia con dificultades persistentes en el funcionamiento ejecutivo infantil. Este estudio aporta evidencia longitudinal que refuerza la importancia de considerar el bienestar parental como un factor clave en el desarrollo neurocognitivo de los niños/as, destacando la necesidad de intervenciones tempranas orientadas a apoyar a las familias en contextos de estrés crónico.

Trabajo 2:

Carolina Panesso Giraldo, María Josefina Escobar

Objetivo: Examinar la asociación entre burnout parental y marcadores psicobiológicos en díadas madre-hijo, considerando cortisol capilar y el funcionamiento ejecutivo infantil. **Método:** Participaron 73 díadas madre-hijo (3-5 años) residentes en Chile, clasificadas en tres grupos según niveles de burnout parental (alto, en riesgo y bajo), medidos mediante el PBA. Se evaluó cortisol capilar en madres e hijos como indicador de estrés crónico, junto con funciones ejecutivas (memoria, flexibilidad e inhibición) y problemas conductuales en niños/as. Se realizaron análisis no paramétricos y modelos de trayectoria (path analysis), controlando variables sociodemográficas. **Resultados:** Se observaron diferencias significativas entre grupos. Madres con alto burnout presentaron mayores niveles de cortisol capilar, patrón que también se replicó en sus hijos/as, evidenciando una asociación

fisiológica diádica. A nivel conductual, los niños/as de madres con mayor burnout mostraron más síntomas internalizantes y externalizantes. En el ámbito cognitivo, se evidenciaron menores niveles de control inhibitorio y desempeño en memoria en estos niños/as. El análisis de trayectoria mostró que el burnout parental se asocia directa e indirectamente con resultados infantiles, mediado parcialmente por el cortisol materno. **Conclusiones:** Los hallazgos sugieren que el burnout parental no solo afecta el bienestar del cuidador, sino que se asocia con alteraciones fisiológicas, conductuales y cognitivas en los hijos/as. Este estudio aporta evidencia novedosa al integrar biomarcadores de estrés crónico en el estudio del burnout parental, destacando la importancia de abordajes diádicos y multimétodo en la comprensión del desarrollo infantil en contextos de estrés.

Trabajo 3:

Francisca Pérez, Matías Montecinos, Vicente Soto, Lukas Valenzuela, Luciana Muñoz, María Josefina Escobar

Objetivo: Analizar la relación entre la coordinación coparental y los procesos neuropsicológicos implicados en el desarrollo infantil, integrando medidas conductuales, cognitivas y neurofisiológicas en un marco de interacción familiar. **Método:** Se evaluaron díadas y tríadas familiares con niños/as en edad temprana, combinando medidas de desarrollo cognitivo y socioemocional (ASQ-3, ASQ-SE), observación de la interacción coparental (Lausanne Trilogue Play) y análisis de sincronía inter-cerebral (inter-brain synchrony, IBS) mediante técnicas de hyperscanning EEG. Se examinaron asociaciones entre variables familiares, educativas y neuropsicológicas utilizando análisis correlacionales robustos. **Resultados:** Los resultados muestran que la coordinación coparental se asocia de manera consistente con el ajuste socioemocional infantil, pero no con el desarrollo cognitivo global. En contraste, el nivel educativo parental se relaciona fuertemente con el

desempeño cognitivo. A nivel neurofisiológico, la sincronía inter-cerebral entre cuidadores emerge como un posible marcador de procesos de co-regulación e interacción interpersonal, aunque sus asociaciones con resultados infantiles aún requieren mayor evidencia. **Conclusiones:** Estos hallazgos sugieren que el desarrollo infantil debe entenderse desde una perspectiva neuropsicológica relacional, donde los procesos cognitivos y socioemocionales dependen de mecanismos parcialmente diferenciados. Mientras el desarrollo cognitivo se vincula más a factores estructurales como la educación parental, el ajuste socioemocional parece depender de procesos dinámicos de interacción y co-regulación, potencialmente mediados por sincronización neural entre cuidadores. Este enfoque amplía los modelos tradicionales al integrar niveles conductuales, cognitivos y neurobiológicos en el estudio del desarrollo.

Evaluación Y Rehabilitación Neuropsicológica En Trastorno De Déficit De Atención Con Hiperactividad: Un Enfoque Integrador Con Validez Ecológica

Martínez Morales, Danicza, Arias Ramírez, Yaira Z. , Lopera Vasquez, Juan P., Mesa Martínez, Keisy, Gallego Gallego, Alejandra, Restrepo Aguirre, Sara, Arboleda Ramírez, Alejandra, Pineda Salazar, David A.

Universidad San Buenaventura, Medellín
Hospital Neurológico de Colombia
Semillero de Investigación Neuro-net

Resumen: El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es una condición del neurodesarrollo frecuente en la infancia y considerada un problema relevante de salud pública debido a su impacto funcional en la vida diaria. Se caracteriza por alteraciones en la atención, el control inhibitorio y la regulación conductual, con afectación en el desempeño académico, social y laboral. Aunque su perfil cognitivo y emocional ha sido ampliamente estudiado mediante pruebas neuropsicológicas tradicionales, existe evidencia limitada sobre herramientas con mayor validez ecológica que permitan comprender el funcionamiento cotidiano del individuo. Asimismo, se requiere fortalecer el desarrollo de intervenciones que integren componentes ecológicos orientados a mejorar la funcionalidad en contextos reales, tanto individuales como grupales. En este contexto, el presente simposio propone un enfoque integrador entre evaluación e

intervención neuropsicológica. El primer trabajo aborda el uso de tecnologías emergentes, específicamente la realidad virtual, como herramienta de evaluación en TDAH, destacando su potencial para aproximarse a situaciones de la vida diaria. Los dos siguientes trabajos presentan intervenciones clínicas individuales en adultos con TDAH, orientadas al fortalecimiento de habilidades instrumentales de la vida diaria y a la disminución de la sintomatología funcional asociada al trastorno. Finalmente, el cuarto trabajo expone una intervención grupal dirigida al fortalecimiento de funciones ejecutivas, la autorregulación y la adaptación funcional en escenarios sociales. En conjunto, los estudios incluidos resaltan la necesidad de avanzar hacia modelos de evaluación e intervención neuropsicológica con mayor validez ecológica, centrados en la funcionalidad y la participación del individuo en su entorno cotidiano y social.

Trabajo 1

Rendimiento cognitivo de niños y adultos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la evaluación Neuropsicológica en realidad virtual.

Martínez Morales, Danicza^{1,2,3}; Arias Ramírez, Yaira Z. ^{1,2,3}
Lopera Vasquez, Juan P ^{2,3}

¹ Semillero de Investigación Neuro-net.

² Universidad San Buenaventura, Medellín.

³ Hospital Neurológico de Colombia.

Introducción: El perfil cognitivo, comportamental y emocional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) ha sido evaluado mediante pruebas neuropsicológicas tradicionales en contextos clínicos estandarizados, las cuales ofrecen alta confiabilidad; sin embargo, presentan limitaciones en su validez ecológica al no representar adecuadamente el funcionamiento en la vida cotidiana (Chaytor et al., 2003). En este contexto, la realidad virtual (RV) surge como una alternativa de evaluación que conserva elementos de la neuropsicología tradicional e incorpora componentes ecológicos mediante la simulación de situaciones

reales con mayor validez funcional (Parsons et al., 2013). En TDAH, estudios con herramientas como Aula Nesplora han mostrado adecuada sensibilidad para la identificación de alteraciones cognitivas asociadas al trastorno (Zulueta et al., 2018). **Objetivo:** Caracterizar el rendimiento cognitivo y las funciones ejecutivas en niños, adolescentes y adultos con TDAH mediante evaluación neuropsicológica en entornos de RV. **Metodología:** Estudio descriptivo prospectivo con enfoque cuantitativo y diseño transversal. La muestra estuvo conformada por niños de 6 a 12 años, adolescentes de 13 a 18 años y adultos de 19 a 29 años con diagnóstico

de TDAH, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Resultados: Se observaron correlaciones significativas en el rendimiento cognitivo entre niños y adolescentes, sin diferencias por género. La herramienta Aula Nesplora mostró adecuada sensibilidad diagnóstica para la identificación de

alteraciones asociadas al TDAH. Conclusiones: La realidad virtual constituye una herramienta prometedora para la evaluación neuropsicológica del TDAH con mayor validez ecológica. Se recomienda ampliar estudios comparativos que incluyan población adulta en entornos inmersivos y longitudinales.

Trabajo 2

Efecto de una intervención neuropsicológicas en las funciones ejecutivas implicadas en la toma de decisiones en un paciente universitario diagnosticado con TDAH

Mesa Martínez, Keisy^{1,2}, Martínez Morales, Danicza^{1,2,3}

¹ Semillero de Investigación Neuro-net.

² Universidad de San Buenaventura, Medellín.

³ Hospital Neurológico de Colombia.

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la adultez se caracteriza por alteraciones en atención, impulsividad y disfunción ejecutiva, con impacto en toma de decisiones y funcionamiento académico, social y laboral. Estas alteraciones se asocian a dificultades en control inhibitorio, planificación y regulación conductual (Faraone et al., 2015). Objetivo: Evaluar el efecto de una intervención neuropsicológica en las funciones ejecutivas implicadas en la toma de decisiones en un paciente universitario con TDAH. Metodología: Estudio experimental de caso único (N=1) con diseño A-B de no reversión. Se realizaron tres mediciones en línea base y cinco en fase de intervención, complementadas con la evaluación de actividades avanzadas de la vida diaria y síndrome disejecutivo. La intervención constó de 22 sesiones con entrenamiento cognitivo computarizado (CogniFit) y

actividades ecológicas orientadas a la generalización funcional. El análisis de datos se efectuó mediante comparación de ambas fases utilizando indicadores propios de diseños de caso único. Resultados: La toma de decisiones fue el dominio más comprometido, con impacto en la vida cotidiana. Se evidenció afectación en memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas orbitomediales. Tras la intervención se observaron mejoras en planificación, control inhibitorio, autorregulación y toma de decisiones, con mayor organización conductual y mejor desempeño funcional. Conclusión: La intervención neuropsicológica basada en entrenamiento cognitivo computarizado y actividades ecológicas favoreció el fortalecimiento de funciones ejecutivas implicadas en la toma de decisiones en adulto con TDAH, promoviendo mejor adaptación funcional en la vida diaria.

Trabajo 3

Efecto de una intervención neuropsicológica sobre la memoria de largo plazo en un estudiante universitario joven con trastorno por déficit de atención tipo inatento.

Gallego Gallego, Alejandra ¹, Lopera Vásquez, Juan Pablo ^{1,2}

¹ Universidad San Buenaventura, Medellín.

² Hospital Neurológico de Colombia.

Introducción: El Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) de tipo inatento, se asocia con alteraciones en la atención sostenida, la memoria de trabajo y el control inhibitorio. Estas dificultades inciden directamente en los procesos de codificación y recuperación de la información, afectando la memoria a largo plazo, especialmente en el dominio verbal.

Debido a ello la rehabilitación neuropsicológica (RN) es una alternativa terapéutica que puede enfocarse en programas estructurados que incorporen estrategias mnemotécnicas y que favorezcan la memoria. Objetivo: evaluar el efecto de una RN en la memoria de largo plazo en un adulto joven con TDAH de predominio inatento. Metodología: Diseño de caso único, de carácter

cuasiexperimental, formato A-B. En la fase B, con 24 sesiones de RN, con mediciones a lo largo de las intervenciones y aplicación de valoración de la memoria. Resultados: RN basada en estrategias ecológicas, la memoria verbal y el desempeño en la vida diaria, especialmente en el ámbito académico universitario, incluyendo estrategias compensatorias. Se evidenció mejora en el uso de estrategias cognitivas y externas, como la categorización, la asociación semántica y el

apoyo en agendas y alarmas. La intervención resultó efectiva en las quejas de memoria y cognitivas.

Conclusiones: Los hallazgos son congruentes con estudios que destacan la efectividad de las estrategias mnemotécnicas y organizativas para mejorar la memoria, respalda la eficacia de la RN en adultos jóvenes con TDAH tipo inatento, aunque el diseño metodológico limita la generalización de los hallazgos pero aporta en el análisis clínico, individual y ecológico.

Trabajo 4

Efecto de una intervención neuropsicológica grupal centrada en el control inhibitorio sobre la gravedad de los síntomas y la conducta ejecutiva en niños con TDAH

Restrepo Aguirre, Sara^{1,2,3}; Arias Ramírez, Yaira Z.^{1,2,3}
Arboleda Ramírez, Alejandra³; Pineda Salazar, David A.^{2,3}

¹ Semillero de Investigación Neuro-net.

² Universidad San Buenaventura, Medellín.

³ Hospital Neurológico de Colombia.

Introducción: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) es un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por inatención, hiperactividad e impulsividad, asociado a alteraciones en funciones ejecutivas (FE). Las intervenciones neuropsicológicas grupales se constituyen en una alternativa posible (Chu et al. (2022; Rantanen et al., 2018) que puede representar mejoría en la sintomatología y contribuir al abordaje multimodal (NICE Guideline, 2018; Pérez Hernández, 2007; Shuai et al., 2021). Objetivo: Evaluar el efecto de una intervención neuropsicológica grupal centrada en control inhibitorio sobre la gravedad de los síntomas y la conducta ejecutiva en niños con TDAH. Metodología: Estudio cuasiexperimental, con diseño pre-post en un solo grupo. Participaron 21 niños entre los 9 y 12 años con diagnóstico de TDAH. La intervención consistió en 12 sesiones

grupales orientadas al entrenamiento del control inhibitorio en sus componentes motor, cognitivo, conductual y emocional, junto con tres sesiones psicoeducativas dirigidas a padres. Se utilizaron el ADHD-RS-5 y el BRIEF-2 para evaluar cambios en síntomas y funciones ejecutivas. Resultados: De forma preliminar, los reportes de padres indican una disminución de la impulsividad, mejoría en el rendimiento académico y mayor tiempo de permanencia en la tarea evidentes en el tamaño del efecto estimado. Asimismo, los niños refieren percibir un mayor control de sus impulsos. Conclusiones: Las intervenciones grupales se constituyen en una estrategia prometedora para el abordaje del TDAH que sugiere efectos positivos de la intervención sobre la regulación conductual, se requiere continuidad en estudios en relación a ello con ampliación de los grupos a intervenir.

Intervenciones Mediadas Por Tecnología: Nuevas Fronteras En La Evaluación Y Rehabilitación Neuropsicológica

La evaluación y la rehabilitación neuropsicológica se enfrentan actualmente a importantes transformaciones en relación con los cambios socioculturales de las poblaciones a las cuales van dirigidas, así como a la creciente necesidad de fortalecer entornos de intervención más ecológicos, funcionales y personalizados en comparación con los métodos tradicionales. En este contexto, la integración de la mediación tecnológica en el rol del neuropsicólogo resulta pertinente y necesaria, incorporando herramientas innovadoras como la realidad virtual (RV) y las tareas cognitivas computarizadas (TCC). Estas estrategias permiten desarrollar intervenciones más dinámicas, interactivas y centradas en el contexto real del paciente, favoreciendo la generalización de los aprendizajes (Alzahrani & Veneri, 2018). En cuanto a las evaluaciones neuropsicológicas apoyadas en RV, se han identificado múltiples posibilidades

de aplicación tanto en el ámbito clínico como en el investigativo, facilitando la medición de funciones cognitivas en escenarios simulados con mayor validez ecológica. Por su parte, las intervenciones basadas en TCC se posicionan como una alternativa innovadora dentro de la rehabilitación neuropsicológica, al permitir una estimulación sistemática, adaptable a las necesidades del paciente y con retroalimentación inmediata (Ge et al., 2018; Irazoki et al., 2018). En el presente simposio se presentan dos revisiones de alcance sobre estudios recientes relacionados con la sensibilidad y efectividad de instrumentos basados en RV y TCC para el diagnóstico y la intervención en contextos neuropsicológicos. Asimismo, se incluyen tres trabajos de intervención clínica que implementan TCC en pacientes con patologías neurológicas, específicamente en enfermedad de Parkinson, ataque cerebrovascular y epilepsia.

Trabajo 1:

Sensibilidad, validez ecológica y efectividad en instrumentos de evaluación y rehabilitación neuropsicológica basados en realidad virtual y tareas cognitivas computarizadas: revisiones de alcance

Martínez Morales, Danicza^{1,2,3*}; Gómez Valdivia, Jacqueline^{1,2}; Arias Ramírez, Yaira Z.^{1,2,3*}; Vera, Mariana¹; Lopera Vasquez, Juan P.^{2,3*}

¹ Semillero de Investigación Neuro-net.

² Universidad San Buenaventura, Medellín.

³ Hospital Neurológico de Colombia.

La evaluación neuropsicológica (EN) es un proceso clínico y metodológico que permite explorar de forma sistemática el funcionamiento cognitivo, conductual y emocional del paciente, mientras que la rehabilitación neuropsicológica (RN) constituye la posibilidad de intervención derivada de dicha exploración. Tradicionalmente, el quehacer del neuropsicólogo se ha apoyado en instrumentos estandarizados de lápiz y papel, lo cual puede limitar la validez ecológica y restringir la evaluación del desempeño en situaciones de la vida diaria. En este contexto, la realidad virtual (RV) ha emergido como una herramienta con alta sensibilidad para detectar alteraciones cognitivas, permitiendo captar aspectos que podrían pasar desapercibidos con métodos convencionales. Asimismo, facilita la evaluación de dominios cognitivos en entornos ecológicamente relevantes y funcionales. Por su parte, la RN incorpora herramientas computarizadas

que destacan por su accesibilidad, adaptabilidad, bajo costo y facilidad de implementación en diversos contextos clínicos. Objetivos: Evaluar la sensibilidad y validez ecológica de instrumentos de EN mediados por RV y mapear la evidencia sobre la efectividad de herramientas de RN basadas en tareas cognitivas computarizadas (TCC) en poblaciones con compromiso cognitivo. Metodología: Se realizaron dos revisiones de alcance en PubMed, Sciencedirect, Scopus, Springer Link, Taylor and Francis y EBSCO. Resultados: En EN con RV se identificaron 1867 artículos, seleccionándose 33. En RN con TCC se identificaron 124, incluyéndose 18. Las poblaciones incluyeron ACV, TCE, EM, epilepsia, TDAH, adultos mayores y discapacidad intelectual. Conclusiones: La RV muestra adecuada sensibilidad y validez ecológica. Herramientas como RehaCom y CogniFit presentan evidencia preliminar favorable en rehabilitación cognitiva.

Trabajo 2**Efecto de un programa de rehabilitación neuropsicológica enfocado en funciones ejecutivas en pacientes con enfermedad de Parkinson y trastorno neurocognitivo leve y su impacto en la funcionalidad y calidad de vida: un estudio N=2**Gómez Valdivia, Jacqueline^{1,2}; Arias Ramirez, Yaira Z.^{1,2,3}¹ Semillero de Investigación Neuro-net.² Universidad San Buenaventura, Medellín.³ Hospital Neurológico de Colombia.

La enfermedad de Parkinson (EP) es un trastorno neurodegenerativo progresivo y una condición multisistémica caracterizada por síntomas motores y no motores, que determinan la evolución clínica y la carga global de discapacidad (Aarsland et al., 2021; OMS, 2023). La evidencia sobre la efectividad de programas de RN basados en tarea cognitiva computarizada (TCC) en estos pacientes sigue siendo limitada y heterogénea, especialmente en lo que respecta a su impacto en variables de actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) y de calidad de vida (CV) (Alzahrani & Venneri, 2018; Ge et al., 2018). Objetivo: Evaluar el efecto de un programa de RN enfocado en FE mediante una intervención basada en TCC por medio del software Cognifit en dos pacientes con EP y su impacto en las AIVD y CV. Metodología: Estudio cuasi experimental no controlado, de N=2, cuantitativo con

alcance explicativo, diseñado de no reversión AB de dos fases (fase A: línea de base y fase B: intervención). Los participantes son dos personas adultas, de 65 y 70 años respectivamente, con diagnóstico de EP y TNL monodominio de tipo disejecutivo mediante el software Cognifit. Resultados: cambios favorables en AIVD y CV, aunque con diferencias en la magnitud y consistencia entre los participantes. A nivel de AIVD, se evidenció una tendencia de mejora durante la fase B en comparación con la línea fase A. En ambos pacientes se observó un incremento progresivo en el desempeño funcional. Conclusiones: El programa de RN enfocado en FE generó mejoras en las AIVD y, en menor medida, en la CV de los pacientes con EP, este hallazgo coincide con lo reportado en la literatura, donde los efectos de la rehabilitación sobre la CV tienden a ser más variables y dependen de múltiples factores.

Trabajo 3**Efecto de un programa de rehabilitación neuropsicológica computarizado y ecológico sobre el funcionamiento ejecutivo y la independencia funcional en una paciente adulta con ACV isquémico agudo**Guarín Aristizábal, Blanca Idelmis^{1,2}; Martínez Morales, Danicza^{1,2,3}¹ Semillero de Investigación Neuro-net.² Universidad San Buenaventura, Medellín.³ Hospital Neurológico de Colombia.

Introducción: El ataque cerebrovascular (ACV) isquémico constituye una de las principales causas de discapacidad adquirida en adultos, frecuentemente asociado a alteraciones en funciones ejecutivas que impactan la independencia funcional. Estas dificultades afectan procesos como la planificación, la flexibilidad cognitiva y el control inhibitorio, comprometiendo el desempeño en actividades de la vida diaria (Cicerone et al., 2019). Objetivo: evaluar el efecto de un programa de

rehabilitación neuropsicológica basado en componentes computarizados y ecológicos sobre el funcionamiento ejecutivo y la independencia funcional en una paciente adulta con ACV isquémico. Método: Estudio de caso único (N=1) con diseño A-B. Se realizó evaluación pretest y posttest de funciones ejecutivas, junto con variables clínicas (ansiedad, depresión, estrés, calidad de vida, sueño y dolor). Se incluyeron tres mediciones en línea base (A) y cuatro durante la fase de intervención (B), además de la evaluación de actividades avanzadas de la vida diaria y síndrome disejecutivo.

Resultados: Se evidenció mejoría en el rendimiento en funciones ejecutivas, particularmente en control inhibitorio, flexibilidad cognitiva y planificación. Asimismo, se observó incremento en la independencia funcional en actividades avanzadas de la vida diaria y reducción en los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Las mediciones repetidas mostraron una tendencia favorable

durante la fase de intervención en comparación con la línea base. Conclusiones: La rehabilitación neuropsicológica con enfoque computarizado y ecológico mostró ser una estrategia efectiva para la optimización de funciones ejecutivas y el fortalecimiento de la independencia funcional en pacientes con ACV, con impacto positivo en variables emocionales asociadas.

Trabajo 4

Viabilidad de una herramienta tecnológica de rehabilitación neuropsicológica y los efectos en la memoria, la funcionalidad y la calidad de vida en pacientes con antecedente de epilepsia del lóbulo temporal y lobectomía temporal anterior del Hospital neurológico de Colombia: validación de contenido y estudio piloto

Arias Ramírez, Yaira Z.^{1,2*}; Pineda Salazar, David A.²

¹ Semillero de Investigación Neuro-net.

² Universidad San Buenaventura, Medellín.

³ Hospital Neurológico de Colombia.

Introducción: El diseño e implementación de programas de rehabilitación neuropsicológica para pacientes con Epilepsia del Lóbulo Temporal con lobectomía temporal anterior es fundamental, considerando el riesgo de alteraciones cognitivas. Objetivo: Explorar la viabilidad y el efecto de una herramienta tecnológica de rehabilitación neuropsicológica en paciente adultos con Epilepsia del Lóbulo Temporal y lobectomía temporal anterior, sobre la memoria, la funcionalidad y la calidad de vida. Metodología: estudio descriptivo y explicativo. Resultados: La satisfacción mejoró ($M = 95.5$) y la adherencia fue 93.8 %. Mejoras en las habilidades instrumentales y el puntaje total ($W = 11.5$, $p = .018$, $rbo = -0.75$) y en componentes de la calidad de vida y el puntaje total ($W =$

20, $p = .022$, $rbo = .66$). Cambios en la memoria visual en caras II ($W = .00$, $p = .005$, $rbo = -1.00$) y en la evocación de la figura compleja de Rey ($W = 1.00$, $p = .001$, $rbo = 0.981$). En memoria verbal en el reconocimiento en textos II ($W = 1.00$, $p < .001$, $rbo = -0.983$), el índice de organización ($W = .00$, $p = 0.006$, $rbo = -1.000$) y menor número de los falsos reconocimientos ($W = 42.00$, $p = .020$, $rbo = -.866$). Disminución de las quejas de memoria del paciente ($W = 81$, $p = .045$, $rbo = -.543$). No se evidenciaron diferencias entre lobectomía temporal anterior izquierda y derecha. Conclusión: La intervención ejerció impacto sobre las habilidades funcionales y la calidad de vida, en comparación con las medidas neuropsicológicas formales y los indicadores subjetivos.

Alteraciones neuropsicológicas en pacientes oncológicos: estado actual, avances recientes y retos futuros

María Fernanda Fernández Vélez¹., Tatiana Manrique Zuluaga^{2,3}., Luisa María Forero, María^{3,4} Camila Pérez⁵,
Mónica María Martín Acosta^{6,7}., Juan Carlos Arango Lasprilla^{8,9}

1. Ponce Health Sciences University. (PHSU), Puerto Rico, USA

2. Colegio Colombiano de Psicólogos - Colpsic.

3. Grupo de investigación E.C. Estudios en Ciencias del Comportamiento

4. Liga Colombiana Contra el Cáncer

5. MindPsic SAS

6. Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín, Colombia

7. Universidad Internacional de Valencia.

8. IKERBASQUE. Basque Foundation for Science

9. Departamento de biología celular e histología. Universidad del País Vasco

Introducción el cáncer es un conjunto de enfermedades caracterizadas por la proliferación celular descontrolada y la capacidad de invasión y metástasis en tejidos adyacentes o distantes. su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas debido al envejecimiento poblacional y a mejoras en el diagnóstico y tratamiento, con una supervivencia global variable según el tipo tumoral y el estadio al diagnóstico. en este contexto, las alteraciones neuropsicológicas asociadas al cáncer y sus tratamientos han cobrado creciente interés, especialmente los déficits cognitivos conocidos como ‘chemobrain’ o deterioro cognitivo asociado al tratamiento oncológico. Método se realizó una revisión de la literatura con el objetivo de analizar las principales alteraciones neuropsicológicas en pacientes con cáncer. se consultaron bases de datos como pubmed, scopus y web of science, utilizando términos relacionados con cáncer, quimioterapia, radioterapia y deterioro cognitivo. se incluyeron estudios empíricos y revisiones publicadas en los últimos diez años, en población adulta. Resultados los resultados de la revisión

indican que un porcentaje significativo de pacientes con cáncer presenta alteraciones neuropsicológicas durante o después del tratamiento oncológico. las funciones más afectadas incluyen memoria, atención, velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas, con variabilidad según tipo de cáncer y tratamiento recibido. se han identificado factores de riesgo como la quimioterapia, la radioterapia cerebral, la edad avanzada, el estrés y la comorbilidad médica. además, algunos estudios reportan que entre un 30% y un 75% de los pacientes experimentan deterioro cognitivo en distintas fases de la enfermedad. estos hallazgos subrayan la relevancia clínica del seguimiento neuropsicológico en oncología. Conclusiones se concluye que las alteraciones neuropsicológicas en pacientes con cáncer constituyen un problema frecuente y clínicamente relevante que impacta en la calidad de vida y el funcionamiento diario. la evaluación neuropsicológica temprana y el diseño de programas de rehabilitación cognitiva son fundamentales para mejorar el pronóstico funcional de estos pacientes en la práctica clínica.